



successor t SE

Pethoxamid (ομάδα αμιδίων)
Terbuthylazine (ομάδα χλωροτριζινών)

Γαλακτώδες αιώρημα (SE)

Εγγυημένη σύνθεση:
Pethoxamid 30% β/ο + Terbuthylazine 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 47,02% β/β

**Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο,
με προφυτρωτική και μεταφυτρωτική
εφαρμογή για την καταπολέμηση
μονοκτυλήδων και δικοτυλήδων
ζιζανίων στον αραβόσιτο.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7897/ 2-12-2008

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Κάτοχος της άδειας: CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse, D-21683 STADE, Γερμανία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:



ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το ζιζανιοκτόνο Successor T είναι μίγμα των δραστικών ουσιών Pethoxamid και Terbuthylazine για προφυτρωτική και μεταφυτρωτική εφαρμογή για την καταπολέμηση μονοκτυλήδων και δικοτυλήδων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το Pethoxamid είναι ένα διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο, που απορροφάται από τις ρίζες, τα κολεόπτιλα και τους νέους οφθαλμούς. Το Terbuthylazine απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και τα κολεόπτιλα και μεταφέρεται στους κλωνοποιήστες όπου δρα παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο εφαρμογής: Αραβόσιτος
Στόχος: α) ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Πόα (*Poa* spp.), Σετάρια (*Setaria* spp.)
β) ετήσια πλάτυφυλλα ζιζάνια: Αγριομπαρακιά (*Abitulion theophrasti*), Βλήτο (*Amaranthus* spp.), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Καλινσόγκα (*Galinsoga parviflora*), Γεράνι (*Geranium* spp.), Καπνόχορτο (*Matricaria* spp.), Σκαροβάχανο (*Mercurialis annua*), Κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), Πεντάνευρο (*Plantago major*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Πολυκόμνη (*Polygonum* spp.), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Στελλήθρια (*Stellaria media*), Βερόνικα (*Veronica* spp.), Τσουκνίδα (*Urtica* sp.), Ποικιλ. αγριοπανσές (*Viola tricolor*), Κοινός αγριοπανσές (*Viola arvensis*), *Bidens tripartita*, Τάτουλας (*Datura stramonium*), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*).

Δοσείς: 300κ.εκ./στρέμμα προφυτρωτικά ή 300-340κ.εκ./στρέμμα μεταφυτρωτικά.
Όγκος ψεκ. υγρού: 20-50 λίτρα/στρέμμα.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ζιζανιοκτόνο για προφυτρωτική ή μεταφυτρωτική εφαρμογή από το στάδιο του 1ου φύλλου έως το στάδιο των 4 φύλλων του αραβόσιτου, κατά προτίμηση σε υγρό έδαφος. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους με 20-50 λίτρα νερό / στρέμμα. Για καλύτερα αποτελέσματα η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε υγρό έδαφος προκειμένου το ζιζανιοκτόνο να μπορεί να απορροφηθεί αποτελεσματικά από τις ρίζες των ζιζανίων. Η καλή κατεργασία του εδάφους πριν την εφαρμογή και η επαρκής εδαφική υγρασία βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε τη συσκευασία πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό

συνεχίζοντας την ανάδευση. Εφαρμόστε το ψεκαστικό διάλυμα αμέσως μετά την παρασκευή του. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αναδεύετε συνεχώς. Ξεπλύνετε το δοχείο συσκευασίας με νερό τουλάχιστον 3 φορές, ρίχνοντας τα αποβλήματα στο ψεκαστικό διάλυμα.

Οι ψεκαστές πρέπει να ρυθμίζονται προσεκτικά πριν τον ψεκασμό και να ελέγχονται συχνά για να γίνεται ομοιόμορφος ψεκασμός του σκευάσματος.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Ξέπλυμα με άφθονο νερό και να αδειάζεται το εναπομείναν προϊόν στην καλήίεργεια.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών βλάστηων να εφαρμόζεται το προϊόν κάθε δεύτερη χρονιά και αποκλειστικά με επεμβάσεις στη γραμμική σπορά

Φυτοτοξικότητα: Σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης μετά την εφαρμογή του προϊόντος μπορεί να παρατηρηθεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη του καλαμποκιού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αν γίνεται εφαρμογή σε καινούργια ποικιλία καλό θα ήταν να γίνει δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση ή να συμβουλευθείτε τεχνικό πριν προβείτε σε καθολική εφαρμογή.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν εφαρμόζεται

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου στην καλήίεργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν περάσουν 48 ώρες από την εφαρμογή του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καννίζετε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και ασφαλή προστασία ματιών / προσώπου. • Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων (από την επιφανειακά ύδατα). • Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρα από μη γεωργική γη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Λόγω της δραστικής ουσίας terbuthylazine που περιέχει το προϊόν εμφανίζονται συμπτώματα λόγω δηλητηρίασης όπως απάθεια, υπνηλία, αναπνευστικά προβλήματα, σπληνίτιδα. Αντιδοτό: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
N



Επικίνδυνο
για το περιβάλλον

- Επιβαρύνει σε περίπτωση κατάποσης
- Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα
- Επιβαρύνει μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης

Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δεήτο δεδομένων ασφαλείας. Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα μπετόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημείο συλλογής, για διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενους χώρους, σε κανονικές θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε φιάλη



1113