

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καννίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αποφύγετε την επαφή με το ψεκαστικό υγρό όταν ψεκάζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Μεταφέρατε τον πάσχοντα μακριά από την περιοχή κινδύνου. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που ρυπάνθηκαν ή βράχθηκαν. **Σε περίπτωση κατάποσης**, καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα**, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια**, ξεπλύνετε προσεκτικά με άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Το δραστικό συστατικό του σκευάσματος ανήκει στη χημική ομάδα των triketones. **Θεραπευτική αγωγή:** Βασική υποστήριξη, απομόλυνση, θεραπεία συμπτωματική. Ερεθισμός ματιών και δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:

• Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπórους, προστατευμένο από το κρύο. • Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. • Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα με τη φορά του ανέμου. • Μην διηληψικάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αουθενάτε τις δόσεις. • Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. • Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με διάλυμα 50 κ.ε. Agral / 100 λίτρα νερού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



02/2010-2



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Συσκευαστής-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσα/νικη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Sulcogan®

30SC

Sulcotrione (Σουλκοτριόν) 30%
Συμπυκνωμένο αιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: **Sulcotrion 30% β/ο**

Βοηθητικές ουσίες: 73,45% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Φ.: 7859/22.04.2008

Ημ. Λήξης Έγκρισης: 28.02.2014

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο κατά πλατυφύλλων & αγρωστωδών ζιζανίων στον αραβόσιτο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΣΥΛΛΟΓΚΑΝ:

Μεταφυτρωτικό καταπολέμηση ετησίων πλατυφύλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, στον αραβόσιτο. Μηχανισμός δράσης: Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των τρικετονών παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καθοδικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2,5 atm (40 psi), με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα με μηεκ τύπου σκούπας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Υπό συνεχή ανάδευση, προσθέστε και το υπόλοιπο νερό. Τα κενά συσκευασίας τα ξεπλένετε πολλές φορές ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια. Δόση: **100-150 κ.εκ./στρέμμα**. Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: **150 κ.εκ./στρέμμα**. Μεταφυτρωτικός ψεκασμός στο στάδιο των 2-3 έως 7-8 φύλλων του αραβόσιτου.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα ανά στρέμμα.

Μένιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδος: Μία (1).

Παρατηρήσεις:

1) Καταπολεμώμενα ζιζάνια: Άουβουδιά, αγριοντοματιά, αγριοβαμβάκι, τάτουσας, αγριοειλιτζόνα, λαπάτσα, αγριονιπιά, αναριχώμενο πολύγονο, μαρτιάκος, στελλήδρια, βερδόνια. **Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια:** *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βήλιτο), *Echinochloa crus-galli* (μουστρίτο), *Digitalis sanguinalis* (αιματόχορτο). **2) Η** δοσολογία των 100 κ.ε. εφαρμόζεται όταν έχουμε μικρό πλατύφυλλο (2-4 φύλλα), ενώ η δοσολογία των 150 κ.ε., όταν ο μέγιστος αριθμός των πλατυφύλλων ζιζανίων βρίσκεται περί το 4ο φύλλο ή/και παρουσία αγρωστωδών.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Πιθανή εμφάνιση θειύκασης των φύλλων του καλαμποκιού υπό συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών. Είναι παροδικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την εξέλιξη της καλλιέργειας. Να μην εφαρμόζεται σε ασθενικά φυτά ή υπό συνθήκες καταπόνησης (κακή βλάστηση, φυτά που έχουν πληγεί από το κρύο και από πλημμύρες ή ξηρασία, ή που υποφέρουν από ασθένειες). Να μη χρησιμοποιείται σε καλαμπόκι που προορίζεται για σποροπαραγωγή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο αγρό δεν μπορεί να ενασπαστεί μόνον αραβόσιτος ή σιτηρά. Μην επανέρτετε ή φυτεύετε στον ίδιο αγρό άλλη καλλιέργεια, εκτός από αραβόσιτο ή σιτηρά, πριν περάσουν 9 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξεπλύματα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του απορροβιστική συσκευασία, σε άρροσο και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βρίθνε επί της συσκευασίας.