

Sulcotrek[®] sc

Terbuthylazine (Τερμπουθυλαζίν) 32,7%
Sulcotrione (Σουλκοτριόν) 17,3%
Συμπυκνωμένο αιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: **Terbuthylazine** 32,7% β/ο
Sulcotrione 17,3% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 54,6% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.οφ.: 7912/31.12.2008

**Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τη καταπολέμηση
πλάτυφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια αραβοσίτου.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

**Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε αεροψεκασμούς
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες**

**ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ**

Παρασκευαστής του σκευάσματος:
Agan Chemical Manufacturers Ltd. - Ισραήλ

Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την
τελική συσκευασία και σήμανση-Συσκευαστής:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσα/νικη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



01/A/2010-2

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Εν περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Αντιδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

εφαρμογής του. • Αποφεύγετε τη χρήση του σε εδάφη πολύ αμμόδη, ελαφρά, φτωχά σε οργανική ουσία (<1%), σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις. • Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Αν ρυπαίνετε τα νερά άρδευσης, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. • Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. • Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. • Μετά το ψεκασμό ξεπλύνετε καλά το ψεκαστικό μέσο με νερό και απορρυπαντικό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτές τις συνθήκες, ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης είναι δύο (2) χρόνια.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ



01/Β/2010-2

ΣΟΥΛΚΟΤΡΕΚ:

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τη καταπολέμηση ηλιόφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια αραβοσίτου. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των ζιζανίων. Μηχανισμός δράσης: Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των τρικετονών παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καρβοτενοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD (sulcatrone). Η terbutylazine αναστέλλει την φωτοσύνθεση και την αναπνοή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ομοιόμορφος ψεκασμός με 30-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με πίεση μικρότερη των 3 ατμ. (45 psi) και μικρό τύπου σκούπας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού στο συνεχίζοντας την αναδέουση.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Ετήσια ηλιόφυλλα ζιζάνια (Γραχύ βήτα, Τάτουλας, Αγριοντοματιά, Λου-Βουδιό). Δόση: **200-260 κ.εκ./στρ.** με 30-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογή μεταφωτρωτική της καλλιέργειας και των ζιζανίων. Στάδιο καλλιέργειας, 3-5 φύλλα (περίπου 10 εκ. ύψος) και στάδιο ζιζανίων, 2-4 φύλλα.

Παρατηρήσεις:

1) Η χαμηλή δόση να εφαρμόζεται σε ελαφριάς, ενώ η υψηλότερη σε μέσης ή βαριάς σύστασης εδάφη. 2) Μετά την μεταφωτρωτική εφαρμογή, εάν δεν ακολουθήσει βροχή τουλάχιστον 10-15 κιλιοστάις εντός 2 εβδομάδων, να εφαρμοσθεί ελαφρύ πότισμα. 3) Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. Να μη χρησιμοποιείται σε καθαρές σειρές αραβοσίτου, που προορίζονται για την παραγωγή γηλυκού καλλυμνοκίου ή σπόρου σποράς.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Δε χρειάζεται να προταθεί χρόνος αναμονής από την εφαρμογή και μέχρι τη συγκομιδή, εφόσον η εφαρμογή του συνιστάται να γίνεται ενωρίς, περίπου έως 10 εκ. ύψος της καλλιέργειας και η εφαρμογή του συνιστάται για τον αραβόσιτο (σπόρο - δημητριακό) και όχι για το γηλυό καλλυμνό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στον Αραβόσιτο, όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα του προϊόντος, στις ελληνικές εδαφο- κλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Εφαρμόζεται μόνο του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλο σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.