

Σάμπερ Όιλ

SUMMER OIL

Εντομοκτόνο

Εγγυημένη σύνθεση: Paraffinic Oil : 95 % β/β
Βοηθ. ουσίες: 5 % β/β

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Paraffinic Mineral Oil (Παραφινικό λάδι) 95%

Θερινός πολτός κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων.

• Ερεθίζει τα μάτια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Εγκρ.Κυκλοφορίας: 1912/17.01.2002

Κάτοχος της Έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, Βούλαγρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 10 λίτρα



SUMMER OIL

Paraffinic Oil (Παραφινικό λάδι) 95%

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Μην αναμιγνύετε αεροζολιοποιημένο. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και σκελετική προστασία. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αερισμένο χώρο. • Το υλικό αυτό και ο παρασκευαστής του να απορριφθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή εύφλετων αποβλήτων. • Στάψτε τη λειτουργία από τον παραγωγό/παρασκευαστή να ανακτήσει ανακυκλώσιμα. • Αποφύγετε την διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτία δεδομένων ασφαλείας. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** • Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και σαπούνι. • Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα: Ο πάγων να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειάζεται ζητήστε ιατρική βοήθεια **Αντίδοτο:** Συμβουλευτείτε το τοξικό κέντρο ή το νοσοκομείο. **ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΕΩΣ: 210 7793777**

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια βλαπτική επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μην ρυπάνετε τα νερά με το περιεχόμενο ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε τη διάθεση ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδατικές επιφάνειες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ: Γκρέιπ φρούτ, Λεμόνι, Μανταρίνι, Πορτοκαλιά, Φράπα: Κόκκινη Ψώρα (Acanthia aurantii), Ψευδοκκόκος (Planococcus citri), Λεκάνιο (Saissetia oleae), Ασπίδα Ψώρα (Aspidiotus nerii) Μάυρη Ψώρα (Parlatoria zizyphi), Άλλα κοκκοειδή (Chrysomphalus dictyospermi, Pericarya purchasi, Ceroplastes rusci, C. sinensis, Myulococcus becki, Coccus hesperidum), Τετράνυχος (Panonychus citri, Tetranychus urticae, Eriophyes sheldoni, Aculus pelecassi), Αλευράδες (Dialeurodes citri, Aleurothrips floccosus). **Δόση:** 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα νερό, ή 500 κ.εκ./100 λίτρα νερό, σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοστεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: **Ανοιξιάς** (με την έναρξη της βλάστησης). **Καλοκαίριου. Φθινοπώρου.** **Χειμώνα.** Η καλύτερη εποχή είναι αρχές Ιουνίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και τον χειμώνα (Δεκεμβρίου-Μαρτίο).

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μήλα, Αγγούρι: Ψώρα Σαν-Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Βαμβακάδα (Pseudalacaspis pentagona), Μυτιλόμορφη Ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Στάχτι ψώρα (Epidiaspis loperii), Φυλλοδέστες (Archips rosanus, A. podanus), Τετράνυχος (Tetra nychus urticae, Panonych chus ulmi, Bryobia rubricollis), Ψύλλα (Psylla spp.), Αφίδες (Eriosoma lanigerum, Aphis pomi, Dysaphis piri, D. plantaginea). **Δόση:** 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα νερό, ή 500 κ.εκ./100 λίτρα νερό, σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοστεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: **Ανοιξιάς** (με την έναρξη της βλάστησης). **Καλοκαίριου. Φθινοπώρου. Χειμώνα.**

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερυκοκιά, Κερασιά, Ροδάκινά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά: Ψώρα Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Βαμβακάδα (Pseudalacaspis pentagona), Σφαυρολέκανιο (Sphae roleanium prunastri), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Μυτιλόμορφη Ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Αφίδες (Myzus persicae, Aphis spp.), Φυλλοδέστες (Archips rosanus, podanus) Ακάρεα (Tetranychus spp., Bryobia rubricollis), Ψύλλα (Psylla spp.), Προνύμφες αράων και άλλων εντόμων. **Δόση:** 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα νερό, ή 500 κ.εκ./100 λίτρα νερό, σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοστεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: **Ανοιξιάς** (με την έναρξη της βλάστησης). **Καλοκαίριου. Φθινοπώρου. Χειμώνα.**

ΕΛΙΑ: Λεκάνιο (Saissetia oleae), Ασπιδιώτης (Aspidiotus nerii), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Πολύνια (Pollinia pollini), Μυτιλόμορφη Ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Βαμβακάδα (Euphyllura olivina), Προνύμφες εντόμων. **Δόση:** 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα νερό, ή 500 κ.εκ./100 λίτρα νερό, σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοστεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: **Ανοιξιάς** (με την έναρξη της βλάστησης). **Καλοκαίριου. Φθινοπώρου. Χειμώνα.**

ΚΑΛΑΜΠΟΥΧΙΑ: Κοκκοειδή (Parlatoria spp., Aspidiotus spp., Diaspis spp., Saissetia oleae, Icerya purchasi, Ceroplastes sinensis, Pseudococcus spp.), Φυλλορύκτες (Narthecium centifoliella, Hyponomeuta malinellus, Leucocoptera spp.), Φυλλοδέστες (Toxotia spp.), Αφίδες (Aphis spp.). **Δόση:** 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα νερό, ή 500 κ.εκ./100 λίτρα νερό, σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοστεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: **Ανοιξιάς** (με την έναρξη της βλάστησης). **Καλοκαίριου. Φθινοπώρου. Χειμώνα.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Κατά τη χρήση του θηριονίου πολλού τα δέντρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.

• Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας.
• Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
• Να μην γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.
• Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή διασπειρόμενων.
• Στα μπλοκεία και ειδικά στα κροστιάλα ή με την προμετρήσιμη ή έπεται εφαρμογή Κάρπας, Φολπείτ, Διπτοενοσάνων, Καρμπουλά σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.
• Να μην χρησιμοποιείται μαζί με Καρμπουλά στα σποροφόρα δένδρα.

• Οι όγκοι ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι: **ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ:** 200-400 λίτρα / στρέμμα, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ - ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** 150-250 λίτρα/στρέμμα, **ΕΛΙΑ:** 150-300 λίτρα/στρέμμα, **ΚΑΛΑΜΠΟΥΧΙΑ:** 80 λίτρα/στρέμμα. • Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργασία: 1-4 εφαρμογές.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κανού ογκού (5-6ατμ) ή μηχανοκίνητους (25-30 ατμ) και μικρού τύπου σκούπας. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλακτώμα και το διαλύουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας μέχρι σκεύασμα να είναι ομοιόμορφο. Το σκεύασμα πρέπει να προστεθούν όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλακτώμα του ορυκτέλαιου αναδεύεται καλά. Σε περίπτωση που το αναμειγμένο με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάσουμε πρώτα το αραιωμένο γαλακτώμα ορυκτέλαιου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις χρήσης, δόσεις και προφυλακτικές χρήσεις του. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ελαιώδη στο λάδι φυτά (π.χ. σε μερικά καλλοπιστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα συνδυάζεται με όλα τα γνωστά εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα. Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θειασβεστίο, θείο, παραργίτη, καρπέν, διπινσάρ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΒΛΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 21 ημέρες.
Σε περίπτωση αναμειγνύμενων με άλλο σκεύασμα σφειόμενων, να τηρούμε την τελευταία επιβλάση του άλλου σκευάσματος (αν αυτό είναι πάνω από 21 ημέρες).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Στην αρχική του αποβάθραση συσκευασίας, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Το υλικό αυτό και ο περιεχόμενος του να αναποστείλονται σε χωριστούς χώρους επικινδύνων ή εύφλετων αποβλήτων. Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/ προμηθευτή για ανάκτηση/ ανακύκλωση. Το υλικό και ο περιεχόμενος του να θεωρηθούν κατά την διάθεση τους επικινδύνους αποβλήτα. Αποφύγετε την διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

