

SUN OIL 11E

paraffinic mineral oil
(παραφινικό λάδι) 99,1%

Υγρό γαλακτωματοποιίσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:
Paraffinic mineral oil: 99,1% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 0,9% β/β

**Χειμερινό λάδι
κατά κοκκοειδών, αυγών ακάρεων
και διαχειμάζουσων μορφών εντόμων.
Συνεργό ζιζανιοκτόνων.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ**

Αριθμ.Εγκρ. Κυκλοφ.: 1233/1981

Περιεχόμενο: 4 λίτρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ: SUN OIL COMPANY ΒΕΛΓΙΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

Κ.Ι. Ευθυμιάδης ΟΕΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

SUN OIL 11E

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το SUN OIL 11E είναι παραφινικό λάδι υψηλής απόδοσης. Χρησιμοποιείται σκέτο ή σε συνδυασμό με εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ακαρεοκτόνα για ψεκασμούς σε δένδρα και καλλινοσησια. Χρησιμοποιείται και ως συνεργό ζιζανιοκτόνων.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλίες, Αχλαδιές): για Ψώρα Σαν-Ζοζέ, Παρήλτορία, Βαμβακάδα, Μυτιήμορφη ψώρα, Μαύρη ψώρα, Αυγά αφίδων και τετρανύχων, Διαχειμάζουσες μορφές εντόμων.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκίες, Κερασιές, Ροδακινιές, Νεκταρινιές, Δαμασκηνιές), ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: για Ψώρα Σαν-Ζοζέ, Βαμβακάδα, Παρήλτορία, Μυτιήμορφη ψώρα, Μαύρη ψώρα, Αυγά αφίδων και τετρανύχων, Διαχειμάζουσες μορφές εντόμων.

ΚΑΛΟΠΙΣΤΙΚΑ - ΚΑΛΟΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ: για Παρήλτορία, Μυτιήμορφη ψώρα, Αυγά αφίδων και ακάρεων, Διαχειμάζουσες μορφές εντόμων.

Δοσολογία: 1500-2000 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα νερό ή 500 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα νερό σε συνδυασμό με την συγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου.
Χρόνος Εφαρμογής: Χειμερινοί ψεκασμοί στο στάδιο του ληθάργου και στα μηλοειδή μέχρι την έναρξη διόγκωσης των σφραγισμών.

ΑΜΠΕΛΙ - ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: για χειμερινά αυγά κόκκινου τετρανύχου.

Δοσολογία: 1000-1500 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα νερό.

Χρόνος Εφαρμογής: τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα και πριν την έναρξη διόγκωσης των σφραγισμών.

ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

Λιμπερή-Ακτινιδιά: 50, Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα: 150-250, Αμυγδαλιά: 100-200, Καλλινοσησια: 50.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ σαν **ΣΥΝΕΡΓΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ:**

Δοσολογία: 500 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα νερό σε συνδυασμό με την συγκεκριμένη δόση ενός μεταφωτοτοξικού ζιζανιοκτόνου.

Όγκος Ψεκαστικού Υγρού: εξαρτάται από την καλλιέργεια στην οποία εφαρμόζεται.

Εφαρμογή: Να ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας του ζιζανιοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

• Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.

• Η εφαρμογή να γίνεται όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 4°C και δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού.

• Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 μέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειοσβεστίου.

• Στα μηλοειδή και ειδικά στο ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, διντροσενώσεων, carbaryl σε διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί καθύψους φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μικτού τύπου σκούπας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

• Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. • Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλακτώμα και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. • Προσθέτετε το υπολείπιο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. • Σε περίπτωση που θα πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτά γίνονται αφού πρώτα το γαλακτώμα του ορυκτέλαιου αναδεύεται καλά. • Σε περίπτωση που το αναμίξετε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζετε πρώτα το αραιωμένο γαλακτώμα ορυκτέλαιου και μετά προσθέτετε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη. • Γενικά προσθέτουμε πρώτα τα άλλα φυτοφάρμακα και τελευταίο το SUN OIL 11E.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα συνδυάζεται με όλα τα γνωστά εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, captan, dinocap, propargite.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ σε μερικά Καλλινοσησια). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΚΟΜΙΔΗ:

Εφαρμόζεται στο στάδιο του ληθάργου.

Σε περίπτωση αναμίξεως με άλλο σκεύασμα οφείλουμε να τηρούμε την «τελευταία επέμβαση» του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 20 ημέρες).

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

Όλες οι καλλιέργειες: 1

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα και ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
- Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.
- Το υλικό το οποίο περιέχει το προϊόν να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Σε περίπτωση κατάποσης να μη προκληθεί εμετός: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθαρτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- Μη ρουφάτε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα: Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζητείστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ξεπλύση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του αναρρόστη συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ/ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
Βλέπε στην επιφάνεια του δοχείου

