

#### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το SUN OIL 7E είναι παραφινικό λάδι υψηλής απόσταξης. Χρησιμοποιείται σκέτο ή σε συνδυασμό με εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ακαρεοκτόνα για ψεκασμούς σε Δένδρα και Καλλιπωστικά.

**ΕΣΠΕΡΙΔΟΙΔΗ** (Γκρέϊφ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Φράπη): για Κόκκινη ψώρα, Ψευδοκκοκκο, Λεκάνιο, Ασπρη ψώρα, Μαύρη ψώρα, Άλλη κόκκοειδή, Τετράνυχιο, Αθήευωδεις.

**ΜΗΛΟΙΔΗ** (Μηλιάς, Αχλαδιές): για Ψώρα Σαν-Ζοζέ, Παρλιτόρια, Βαμβακάδα, Μυτιλήμορφη ψώρα, Σταχτιά ψώρα, Φυλλοδόετες, Τετράνυχιο, Ψύλλα, Αφίδες.

**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκίες, Κερασιές, Ροδακινιές, Νεκταρινιές, Δαμασκηνιές), **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ**: για Ψώρα Σαν-Ζοζέ, Βαμβακάδα, Σφαιροθηλάκιο, Παρλιτόρια, Μυτιλήμορφη ψώρα, Αφίδες, Φυλλοδόετες, Τετράνυχιο, Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων.

**ΕΛΙΕΣ**: για Λεκάνιο, Ασπιδιώτες, Παρλιτόρια, Ποήνια, Μυτιλήμορφη ψώρα, Βαμβακάδα, Προνύμφες εντόμων.

**ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ**: για Κόκκοειδή, Φυλλορύκτες, Φυλλοδόετες, Αφίδες.

**Δοσολογία**: 1000-1300 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα νερό ή 500 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα νερό σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου.

**Χρόνος Εφαρμογής**: Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης β) καλοκαιριού γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα.

Η καλύτερη εποχή για επεμβάσεις στα Εσπεριδοειδή είναι αρχές Ιουνίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και τον χειμώνα (Φεβρουάριο - Μάρτιο).

**ΑΜΠΕΛΙ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ**: για χειμερινά αυγά κόκκινου τετράνυχου.

**Δοσολογία**: 1000 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα νερό.

**Χρόνος Εφαρμογής**: Τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα και πριν την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών.

**ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ)**:

Αμπέλι-Ακτινιδιά: 50, Εσπεριδοειδή: 200-400, Μηλοειδή-Πυρνόκαρπα: 150-250, Αμυγδαλιά: 100-200, Ελιά: 150-300, Καλλιπωστικά: 80.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

• Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.

• Κατά τη χρήση του SUN OIL 7E τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζετε μία βδομάδα πριν από τον ψεκασμό.

• Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας.

• Να μη γίνεται εφαρμογή με το SUN OIL 7E όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32 °C γιατί μπορεί να εμφανισθούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.

• Να μη γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.

• Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκευάσμα επί 30 μέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.

• Στα μηλοειδή και ειδικά στο ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, διντροσενώσεων, carbaryl σε διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.

• Να μη χρησιμοποιείται μαζί με carbaryl στα οπωροφόρα δέντρα.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μικρής τύπου σκούπας.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

• Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. • Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. • Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. • Σε περίπτωση που θα πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά. • Σε περίπτωση που το αναμιγνύετε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζετε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτετε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**: Το σκευάσμα συνδυάζεται με όλα τα γνωστά εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, captan, dinocap, propargite.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ**: Το σκευάσμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ σε μερικά καλλιπωστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

#### ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι, Ακτινιδιά: Μην εφαρμόζομαι

Λοιπές καλλιέργειες: 20 ημέρες

Σε περίπτωση αναμιγνύω με άλλο σκευάσμα οφείλουμε να τηρούμε την «τελευταία επέμβαση» του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 20 ημέρες).

#### ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

Αμπέλι, Ακτινιδιά: 1, Λοιπές καλλιέργειες: 4

# SUN OIL 7E

paraffinic mineral oil  
(παραφινικό λάδι) 99,1%

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:  
Paraffinic mineral oil 7N: 99,1% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 0,9% β/β

Θερινόσ ποητός  
κατά κόκκοειδών, ακάρεων  
αφίδων και λεπιδοπτέρων

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

Αριθμ.Εγκρ. Κυκλωφ.: 1234/30.3.1981

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ: SUN OIL COMPANY ΒΕΛΓΙΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

Κ.Υ.Ε. Ευθυμιάδης αβεε

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε πριν τελειώσετε τον ψεκασμό και πλυθείτε καλά.
- Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
- Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Σε περίπτωση κατάποσης να μη προκληθεί εμετός: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθυστα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

#### Πρώτες βοήθειες - Αντιδοτό:

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα: Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζητείστε ιατρική βοήθεια.

Αντιδοτό: Συμπρωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον.

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ/ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη

**ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ**

Το CATAPULT είναι κατάλληλο για τη χρησιμοποίησή του αποκλειστικά με το αποφυλλωτικό βάμβακος HARVADE στην **δόση των 100 κ.εκ./στρέμμα**  
Γιά την εποχή του ψεκασμού ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του αποφυλλωτικού βάμβακος HARVADE.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ**

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα νερού που απαιτείται για την έκταση που θα ψεκασθεί. Στη συνέχεια προσθέστε το CATAPULT στην απαιτούμενη δοσολογία με συνεχή ανάδευση μέχρις ότου επιτευχθεί πλήρης και ομοιόμορφη διάλυση. Τέλος προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του αποφυλλωτικού HARVADE και την υπόλοιπη ποσότητα νερού με συνεχή ανάδευση.

επιπλέον, την πλην βολώνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του  
**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ** Σε περίπτωση αδιαθεσίας ζητείστε ιατρική συμβουλή και  
δείξτε την ετικέτα.

**ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777**

**Γιά να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον  
ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης**

**ΠΡΟΣΟΧΗ** : Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη ,του  
καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**

Αποθηκεύετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία προφυλαγμένο από τον  
ήλιο σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Αποφύγετε την  
αποθήκευση του προϊόντος σε χαμηλές θερμοκρασίες. Σ' αυτές τις συνθήκες το  
προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: