

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

L170374 GREC/1R

 **Switch[®]**
25/37.5 WG

syngenta[®]

Υδατοδιασπειρώμενοι κόκκοι (WG)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Fludioxonil 25% β/β,

Cyprodinil 37,5% β/β

Βοηθητικές ουσίες 35,8% β/β

**Μείγμα ενός διασυστηματικού
μυκητοκτόνου και ενός
επαφής, με προστατευτική
και θεραπευτική δράση.**

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

200 gr e

Fludioxonil (χημική ομάδα φαινυλοπυρρολίων)
+ Cyprodinil (χημική ομάδα ανιθινοπυριμιδινών)

Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπ. & Τροφ.:
60346/18-1-13

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 2262 051600



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε εκνεφώματα. • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. • Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). • Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. • Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. • Να μην ξαναμπείτε στον αγρό που έχει ψεκαστεί πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκουράστε. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυνθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Να μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα επιφανειακά νερά στο αμπέλι και ανθοκομικά είδη και **15 μέτρων** στις δενδρώδεις καλλιέργειες.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Τα φαινυλοπυρρολικά (fludioxonil) προκαλούν βλάβες στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων. Οι ανιλινοπυριμιδίνες (cyprodinil) παρεμποδίζουν την απέκκριση λιπικών ενζύμων από τα παθογόνα.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και βάψτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος κατευθείαν στο ψεκαστικό υπό συνεχή ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Ξανακαθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό 3 φορές, από όλα τα υπολείμματα, διαλύοντας με καθαρό νερό και ρίχνοντας τα νερά του ξεπλύματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα σακουλάκια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Για την καλλιέργεια του μαρουλιού και των ροικών καλλιεργειών της κατηγορίας αυτής π.χ. σαλάτα, αντίδι κλπ. η δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 60 γρ/σκευάσματος/στρέμμα προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα φυτοτοξικότητας σε ευαίσθητες ποικιλίες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται οι εφαρμογές με SWITCH 25/37.5 WG να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικής ομάδας και διαφορετικού τρόπου δράσης από τις ανιλινοπυριμιδίνες, τις φαινυλοπυρρόλεις και τα δικαρβοξυμιδικά. **Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του σκευάσματος σε όξινα εδάφη.**

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρήστε το στην αρχική του συσκευασία μακριά από τον ήλιο και την υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι επιτραπέζιο, Καρότο – κρεμμύδι ξηρό – σκόρδο – κρεμμύδι φρέσκο, Μαρούλι - Σαλάτα - Αντίδι, -Αρωματικά φυτά (Α+Θ), Μάραθος, Βερίκοκα, νεκταρίνια, ροδάκινα, δαμάσκηνα, κεράσια, καπνός: 7 ημέρες, Αμπέλι οινοποιήσιμο: 21 ημέρες, Μελιτζάνα – πιπεριά – τομάτα – αγγούρι – κολλοκύθι – αγγουράκι για τουρσί (Α+Θ), Φασολάκι με ροβό (Θ), Μήλα, αχλάδια, κυδώνια: 3 ημέρες, Σπαράγγι: 6 μήνες, Φράουλα (Α): 2 ημέρες, Φράουλα (Θ): 1 ημέρα, Ανθοκομικά (Α+Θ): δεν ορίζεται, Φασολάκι με ροβό (Α), Μπιζέλι χωρίς ροβό (Υ): 14 ημέρες, Όσπρια (φασόλια/λουπίνα): 28 ημέρες.

Φάσμα δράσης: Αμπέλι Οινοποιήσιμο: Για *Botrytis cinerea* & *Aspergillus spp.*: 80-100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 80-100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την άνθηση έως την ωρίμανση. Αμπέλι Επιτραπέζιο, Σταφίδα: Για *Botrytis cinerea* & *Aspergillus spp.*: 80-100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 80-100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την άνθηση έως την ωρίμανση.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υ + Θ): Για *Botrytis spp* & *Sclerotinia spp.*: 80-100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 80-100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από τον σχηματισμό των πρώτων καρπών έως και την ωρίμανση. Καρότο (Υ): Για *Alternaria spp* & *Sclerotinia spp.*: 100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 80 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 80 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των 4 φύλλων έως την πλήρη ανάπτυξη. Μάραθος (Υ): Για *Alternaria spp* & *Sclerotinia spp.*: 100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 80 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 80 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των 4 φύλλων έως την πλήρη ανάπτυξη. Κρεμμύδι ξηρό, Σκόρδο (Υ): Για *Botrytis squamosa* & *Sclerotinia spp.*: 120 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 80 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των 10 φύλλων έως την έναρξη του πηγαίσματος. Κρεμμύδι φρέσκο (Υ): Για *Botrytis squamosa* & *Sclerotinia spp.*: 120 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 80 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ανάπτυξη. Μαρούλι, Σαλάτα, Αντίδι, Αρωματικά φυτά (Υ + Θ): Για *Botrytis cinerea* & *Sclerotinia spp.*: 60 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 60 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το πρώτο φύλλο έως και την πλήρη ανάπτυξη του φυλλώματος. Σπαράγγι: Για *Stemphylium botryosum*, *Stemphylium versicarium* & *Botrytis cinerea*: 100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως τον σχηματισμό των ροβών. Όσπρια (φασόλια/λουπίνα): Για *Botrytis cinerea*, *Colletotrichum spp.* & *Sclerotinia spp.*: 100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως τον σχηματισμό των ροβών. Μπιζέλι χωρίς ροβό (Υ): Για *Botrytis cinerea*, *Colletotrichum spp.* & *Sclerotinia spp.*: 100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως τον σχηματισμό των καρπών. Μηλοειδή (Μήλα, Αχλάδια, Κυδώνια): Για *Gloeosporium spp.*, *Botrytis cinerea*, *Penicillium spp.*, *Alternaria spp.*, *Monilia spp.*, *Colletotrichum spp.*, *Nectria spp.*, *Fusarium spp.*, *Ventruria sp.*: 80-100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την έναρξη της άνθησης έως την ωρίμανση. Για Μετασυληκτικές ασθένειες: Ventruria sp., Nectria spp., Monilia spp.: 80-100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή για την αντιμετώπιση μετασυληκτικών ασθενειών. Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερίκοκα: Για *Monilia spp.*: 80-100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την έναρξη της άνθησης έως την ωρίμανση. Κεράσια: Για *Monilia spp.*: 80-100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από το ροζ μπουμπούκι έως την ωρίμανση. Δαμάσκηνα: Για *Monilia spp.*: 80-100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την έναρξη της άνθησης έως την ωρίμανση. Καπνός: Για *Sclerotinia spp.*: 60 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 60 λίτρα/στρέμμα. Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της άνθησης. Έως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών. Ανθοκομικά (Ανεμώνη, Μπιγκόνια, Κυκλάμινο, Βιόλα, Βιολέτα, Πελαργόνιο, Πρίμουλα, Τριαντάφυλλο, Γαρύφαλλο, Χρυσάνθεμο, Φίκος, Μπένζαμιν, Ζέρμπερα, Πανσές, Γεράνι, Πριμούλα, Εξάκον, Ορτανσία, Αζαλέα, Γυψοφίλη, Κάκτοι, παχύφυτα, Λυσσιάνθος, Βιβούρνο σε πλαστικά τούνελ, Ντιόσμα σε πλαστικά τούνελ, Γκιουθέρια, Ίλεξ, Παιόνια) (Υ + Θ): Για *B. Cinerea* & *Aspergillus spp.*: 100 γρ./100 λίτ. ψεκ. υγρού ή 100 γρ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Προληπτική εφαρμογή όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: καπνός: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες, λοιπές καλλιέργειες: 1 εφαρμογή.