



Dow AgroSciences



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:

Dow AgroSciences Export SAS - Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαϊλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσ/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του



Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

Myclobutanil (Μυκλομπουτανίλ) 20%
Εναιώρημα, Λάδι σε νερό

Εγγυημένη σύνθεση: **Myclobutanil** 20% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 79,3% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. οφ.: 60051/08.05.2006

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

® Trademark of the Dow Chemical Company ('Dow') or an affiliated company of Dow

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

01/A/2014-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: _____ Κ.Ε.Κ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην δίνετε τίποτε από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. *Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια*, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΙΣΤΕΪΝ 20%: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ: Ωίδιο, Φουζικλάδιο. Δόση: **18-24 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 100-200 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. Εφαρμογή στα στάδια της πράσινης, ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλων και 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο). **ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ:** Φουζικλάδιο. Δόση: **18-24 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 100-200 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρ. Εφαρμογή στα στάδια της πράσινης, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 15-20 ημέρες αργότερα. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερυκοκιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηλιά):** Ωίδιο. Δόση: **18-24 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 150-250 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρ. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στην πτώση των πετάλων, η δεύτερη στην απόσπαση του κάλυκα και η τρίτη 20 ημέρες αργότερα. **ΑΜΠΕΛΙ:** Ωίδιο. Δόση: **10-15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. Η βασική εφαρμογή γίνεται την άνοιξη, όταν έχουν εκπτυχθεί 2-3 φύλλα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρι-Κολλοκύθι-Καρπούζι-Πεπόνι):** Ωίδιο. Δόση: **24-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες, εφόσον υπάρχει πρόβλημα. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ:** Ωίδιο, Μεθανή κηλίδωση. Δόση: **24-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες. **ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ:** Σκωρίαση. Δόση: **24-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο:

Κολλοκυνθοειδή-Τριανταφυλλιά-Γαρυφαλιά (5), Μηλιά-Αχλαδιά-Μουσμουλιά (4), Πυρηνόκαρπα-Αμπέλι (3).

Παρατηρήσεις: •Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτικές και η μεγάλη για θεραπευτικές εφαρμογές. •Στις καλλιεργείες των Μηλοειδών, Πυρηνοκάρπων, Αμπελιού και Κολλοκυνθοειδών υπό κάλυψη, να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

01/Β/2014-2

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι: **21 ημέρες.**
Κολλοκυνθοειδή: **7 ημέρες.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δε συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλεις/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.