

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

• Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.

• Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς
μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον.

Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτία δεδομένων ασφαλείας. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.



Συστήν

SYSTHANE[®]

Μυκητοκτόνο 4,5 EW

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

myclobutanil (μυκλομπουτανίλ) 4,5%

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με
προστατευτική και θεραπευτική δράση

Εγγυημένη Σύνθεση: myclobutanil 4,5% B/O
Βοηθ. ουσίες: 95,03% B/B

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αριθμός εγκρίσεως κυκλοφορίας: 60146 / 25-2-2008

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:



Dow AgroSciences

DOW AGROSCIENCES LTD UK

Milton Park, Abingdon, Oxon, OX1144RN UK
Tel. +44 1235 772900 Fax +44 1235 774749
Contact person : Fannie Tsali, e-mail: ftsali@dow.com

Διανομέας

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.

Δ. Γλυνοί 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com
www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο 500 κ.εκ.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis), Όιδιο (Podosphaera leucotricha) Δόση: 80-105 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Όγκος ψεκαστ. υγρού: 100-200 λίτρα/στρ. Εφαρμογή στα στάδια πράσινης, ροδίνης καρπής, πτώσης πετάλων και 10-15 μέρες αργότερα (καρπιδίο).

ΑΧΛΑΔΙΑ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ: Φουζικλάδιο (Venturia pirina) Δόση: 80-105 κ.εκ/100 λίτρα ψεκαστ. υγρό. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-200 λίτρα/στρ. Εφαρμογή στα στάδια πράσινης καρπής, λευκής καρπής, πτώσης πετάλων και 15-20 ημέρες αργότερα.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: Όιδιο (Podosphaera oxycanthae, Sphaerotheca pannosa) Δόση: 80-105 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Όγκος ψεκ. υγρού: 150-250 λίτρα/στρ. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στην πτώση των πετάλων, η δεύτερη στην απόσπαση του κάλυκα και η τρίτη 20 ημέρες αργότερα.

ΑΜΠΕΛΙ: Όιδιο (Uncinula necator) Δόση: 45-65 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Όγκος ψεκ. υγρού 50-150 λίτρα/στρ. Βασική εφαρμογή την άνοιξη όταν έχουν εκπτυγθεί 2-3 φύλλα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ: Όιδιο (Sphaerotheca spp., Erysiphe spp., Idium sp.) Δόση: 105-130 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ: Όιδιο (Sphaerotheca pannosa), Μελανή κηλίδωση (Diplocarpon rosae) Δόση: 105-130 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-14 μέρες.

ΓΑΡΙΦΑΛΙΑ: Σκωρίωση (Phragmidium spp.) Δόση: 105-130 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΣΤΡΕΜΜΑ:

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: 210 κ.εκ./στρ. **ΑΧΛΑΔΙΑ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ:** 210 κ.εκ./στρ. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ:** 260 κ.εκ./στρ. **ΑΜΠΕΛΙ:** 100 κ.εκ./στρ. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ:** 130 κ.εκ./στρ. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ:** 130 κ.εκ./στρ. **ΓΑΡΙΦΑΛΙΑ:** 130 κ.εκ./στρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτικές και η μεγάλη για θεραπευτικές εφαρμογές.
2. Στις καλλιέργειες αμπέλι, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και κολοκυνθοειδή υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Μήλα-Αχλαδιά-Μουσουμυλιά 4, Πυρηνόκαρπα 3, Αμπέλι 3, Κολοκυνθοειδή 5, Τριανταφυλλιά-Γαριφαλιά 5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: • ΜΗΛΟΕΙΔΗ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΑΜΠΕΛΙ: 21 ημέρες

• ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: 7 ημέρες

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε φιάλη

