

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική ανάπτυξη στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποτελεσματική διεσυσταμική κίνηση στο boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική ανάπτυξη αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (συμπλοκο II) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας, μέχρις απορρόφης.

ΣΥΝΤΕΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ – ΔΟΣΕΙΣ (γραμ. σκευασματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού)

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ – ΒΕΡΙΦΚΟΚΙΑ

ΔΟΛΑΧΕΝΙΑ (για μονιλία (*Monilia laxa*) και **ιδίω** (*Sphaerotheca pannosa*) ψεκάστε ανά 7 – 14 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την έναρξη της άνθισης μέχρι την πτώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών. Δόση: 60 – 75 γραμ. ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 3.

ΚΑΡΟΤΟ (για μονιλία (*Monilia laxa*) και **ιδίω** (*Sphaerotheca pannosa*) ψεκάστε ανά 7 – 10 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την έναρξη της άνθισης μέχρι την πτώση των πετάλων. Δόση: 60 – 75 γραμ. για μονιλία και 60 γραμ. για ιδίω. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 3.

ΦΡΑΟΥΛΑ (θερμοκίτρου). ^(*) Για **βοτρυτή** (*Botrytis cinerea*) και **ιδίω** (*Sphaerotheca macularia*) ψεκάστε ανά 5 – 7 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την έναρξη της άνθισης μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 135 – 150 γραμ. βοτρυτή και 75 – 100 γραμ. ιδίω. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 3.

ΚΑΡΟΤΟ (υπαίθρου). ^(*) Για **ιδίω** (*Erysiphe heracleae*) και **αλτερνάρια** (*Alternaria dauci*) ψεκάστε ανά 10 – 14 ημέρες (εφόσον απαιτείται) κατά την ανάπτυξη του ερικού συστήματος. Δόση: 100 γραμ. ιδίω και 75 γραμ. αλτερνάρια. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

ΟΛΙΒΑ, **ΠΙΠΕΡΙΑ** (θερμοκίτρου και υπαίθρου). ^(*) Για **βοτρυτή** (*Botrytis cinerea*) και **ιδίω** (*Levellilla taurica*) ψεκάστε ανά 7 – 10 ημέρες (εφόσον απαιτείται) με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Η μετελίσθηση όσων θα πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από έντονη συνθήκες προσβολής. Δόση: 100–150. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

ΜΑΡΟΥΛΙ (υπαίθρου). ^(*) Για **βοτρυτή** (*Botrytis cinerea*) και **σκληριτρίω** (*Sclerotinia sclerotiorum*) ψεκάστε ανά 7 – 10 ημέρες (εφόσον απαιτείται) κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας. Δόση: 120 – 150. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

ΣΠΑΡΑΓΓΙ (για ακούραση (*Puccinia asparagi*) ψεκάστε ανά 10 – 15 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την έναρξη της άνθισης μέχρι τη γήρανση του υπέργειου τμήματος. Δόση: 75 – 100. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

ΚΡΕΜΜΥΔΙ, **ΣΚΟΡΔΟ** (υπαίθρου). Για **βοτρυτή** (*Botrytis cinerea*) και **περονόσπορο** (*Peronospora destructor*) ψεκάστε ανά 10 – 14 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από το στάδιο της πύκνωσης της βάσης των φυτών μέχρι την ανάπτυξη του ανθικού στελέχους. Δόση: 150. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

καλλιεργ. περίοδο: 2.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, για **μονιλία** (*Monilinia spp.*) και **εξώσασο** (*Taphrina deformans*) ψεκάστε ανά 10–15 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. Δόση: 67 – 100. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 – 150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

ΦΙΤΙΚΙΑ, για **καυμοσπορία** (*Botryosphaeria dothidea*) ψεκάστε ανά 10–15 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. Δόση: 50 – 100. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 – 150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

ΚΟΥΚΙΑ (φρέσκα, υπαίθρου), **ΦΑΣΟΛΙΑ** – **χωρίς λοβό** (φρέσκα, υπαίθρου) Για **βοτρυτή** (*Botrytis spp.*), **σκληριτρίω** (*Sclerotinia spp.*) και **ακκούραση** (*Uromyces spp.*) ψεκάστε ανά 10 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την εμφάνιση του 5^{ου} φύλλου μέχρι και το τέλος της άνθισης. Δόση: 100 – 385. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 – 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

ΣΠΑΝΑΚΙ, για **ανθράκωση** (*Colletotrichum sp.*), **περονόσπορο** (*Peronospora sp.*) και **κλαδοσπορία** (*Cladosporium sp.*) ψεκάστε ανά 7 – 10 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την εμφάνιση του 4^{ου} φύλλου μέχρι το φυτό να αποκτήσει το τελικό του μέγεθος. Δόση: 75 – 250. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 – 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΒΑΖΙΛΙΚΟΣ, θερμοκίτρου). Για **σκληριτρίω** (*Sclerotinia sclerotiorum*) και **βοτρυτή** (*Botrytis cinerea*) ψεκάστε από 10 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την εμφάνιση του 5^{ου} φύλλου μέχρι το 70% της ανάπτυξης των φυτών του φούτου. Δόση: 150 – 375. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 – 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

ΚΑΛΛΑΧΕΙΣΤΙΚΑ (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ, θερμοκίτρου). Για **ιδίω** ψεκάστε ανά 10 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την εμφάνιση του 3^{ου} φύλλου μέχρι το τέλος της άνθισης. Δόση: 150 – 375. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 – 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ* (μικρής σημασίας χρήση): Για **αλτερνάρια** (*Alternaria sp.*), **φουκρίω** (*Fusarium laterium*), **ανθράκωση** (*Colletotrichum spp.*), **κλαδοσπορία** (*Cladosporium sp.*) και **σκληριτρίω** (*Sclerotinia sp.*) ψεκάστε ανά 10 – 15 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. Δόση: 67 – 167. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60 – 150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

ΚΑΡΥΔΙΑ* (μικρής σημασίας χρήση): Για **αλτερνάρια** (*Alternaria sp.*), **φουκρίω** (*Fusarium sp.*), **ανθράκωση** (*Gnomonia leptostyla*), **κλαδοσπορία** (*Cladosporium sp.*) ψεκάστε ανά 10 – 15 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. Δόση: 67 – 167. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60 – 150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευασματος. Για τεκμηρίωσι σημασίας χρήσης, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευασματος.



THE CHEMICAL COMPANY

Sigmax[®]

26.7/6.7 WG

**boscalid (μυτοσκαλίντ) +
pyraclostrobin (πυρακλостρομπίν)**

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:
Boscalid 26.7% β/β (ομάδα: καρβαμιδικά)
Pyraclostrobin 6.7% β/β (ομάδα μεθοξυκαρβαμιδικά)
Βοηθητικές ουσίες 65.3% β/β

**Μυκητοκτόνο με προληπτική και κατά περίπτωση
θεραπευτική δράση
που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων,
την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ**

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Προοριζείται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60098/16-01-2014

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: **500 γραμ.**

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:** BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή,
Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αναπνέετε εκκενώματα. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό. • Το υλικό και οι περιέκτες του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους ως απόβλητα από επικίνδυνα υλικά. • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Αποφύγετε επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Εάν εμφανιστούν προβλήματα ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείτε την συσκευασία/ετικέτα στον γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμείνει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να πιείτε φθινόβο νερό. Μην προκαλέτε εμετό και μην δίνετε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής είναι αναισθητός ή έχει απασιασμό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δελτίο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση επικοινωνίας: Κρατήστε τον ασθενή κίνητο, απομακρυνέτε τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΖΩΟΒΙΟΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αδιάκεκτη ζώνη προστασίας **30 μέτρων ή 15 μέτρων** με ακροφύσια μειωμένη διασποράς (75%) από τα επιφανειακά ύδατα για την αμυνδάλια και τη φιστικιά, **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τα ψυχρονή και **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα, συιστάται η μεγαλύτερη δόση.
- Να γίνονται προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Να ακολουθούνται, στις περιχές, όπου εφαρμόζονται συστάσεις των Γεωργικών Προϊοδότησεων.
- Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία αποτελεσματικότητας στην καρυδιά και στη φουντουκιά. Η χρήση του σκευασματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι μεγάλες δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τις χαμηλές δόσεις ψεκαστικού υγρού και αντίστροφα.
- **ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΟΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**
Εφαρμόστε το SIGNUM[®] 26.7/6.7 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
Εφαρμόστε το SIGNUM[®] 26.7/6.7 WG σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 – 3.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΗ

Αμυνδάλια, Φιστικιά, Φουντούκι, Καρυδιά: 28 ημέρες. Κερασιά, Ροδανιά, Νεκταρίνα, Βερικοκιά, Δαμασκηνά, Μαρούλι (υπαίθρου), Φαρούλα φρέσκα χωρίς λοβό (υπαίθρου), Κουκιά φρέσκα (υπαίθρου): 7 ημέρες. Φράουλα (θερμοκίτρου), Τομάτα (υπαίθρου, θερμική), Πιπεριά (υπαίθρου, θερμική): 3 ημέρες. Καρότο (υπαίθρου), Κρεμμύδι-Σκόρδο (υπαίθρου), Σπανακι, Αρωματικά φυτά – Βασιλικός (θερμική): 14 ημέρες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΕΡΜΟΤΗΤΑ
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκευτεί, στην αρχική συσκευασία, σε υγιή κατάσταση, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αερισμένο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.