

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΔΟΣΕΙΣ- ΣΤΟΧΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αμπτέλι (επιτραπέζια ποικιλία σουλτανίνας): Ψεκάσμοι πλήρους κάλυψης του φυλλώματος ή κατευθυνόμενοι ψεκάσμοι στους βότρες όταν η ράγα έχει διάμετρο 4-6 χιλιοστά με δόση 50-100 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Κατά το χρόνο εφαρμογής του **Sitofex® 1 EC** εφαρμόζεται ο συνήθης ψεκάσμος γιββερελλινών. Το **Sitofex® 1 EC** μπορεί να συνδυαστεί με τα συνήθη σκευάσματα γιββερελλινών.

Ακτινίδιο: Ψεκάσμοι πλήρους κάλυψης του φυλλώματος ή κατευθυνόμενοι ψεκάσμοι στους καρπούς με δόση 50-100 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού, 3 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση.

Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται νωρίτερα από 3 βδομάδες από την πλήρη άνθηση, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει παραμορφώσεις στην άκρη των ψεκασθέντων καρπών.

Στόχος: αύξηση του βάρους και του μεγέθους των καρπών.

Όγκος ψεκαστικού υγρού:

Για ψεκασμούς κάλυψης φυλλώματος: 100 λίτρα /στρ.

Για κατευθυνόμενους ψεκασμούς στους καρπούς: 50 λίτρα /στρ.

Μέγιστος αριθμός ψεκασμών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Τρόπος δράσης: Το δρων συστατικό του σκευάσματος forchlorfenuron (CPPU), είναι παράγωγο της φαινυλουρίας και έχει δράση παρόμοια της κυτοκινίνης. Όπως και οι φυσικές κυτοκινίνες το forchlorfenuron προάγει τη διαίρεση και την αύξηση των κυττάρων των φυτικών ιστών. Δεν μετακινείται μέσα στα φυτά, ούτε μεταφέρεται από τα ψεκασμένα φύλλα στους καρπούς και από τον έναν καρπό στον άλλον.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύντε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Φυτοτοξικότητα: Το σκευάσμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις εγκεκριμένες χρήσεις, εφόσον πληρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Επιτρέπεται η χρήση του **MONO σε εδάφη με ουδέτερο ή αλκαλικό ΡΗ**. Μετά την εφαρμογή του Sitofex® αυξάνονται οι απαιτήσεις του φυτού για να παράγει. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η λίπανση και η άρδευση των φυτών ανάλογα με το φορτίο των φυτών. Το Sitofex® μπορεί να προκαλέσει ελαφρά μεταβολή στο σχήμα των καρπών. Ειδικότερα καλλιέργειες όπου η επικονίαση είναι ελλιπής, τείνουν να παράγουν καρπούς μικρότερου μήκους και ογκώδεις μετά την εφαρμογή του Sitofex®. Για το λόγο αυτό το Sitofex® θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε καλλιέργειες όπου έχει γίνει καλή επικονίαση.

© AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg (Germany)

Sitofex® 1 EC

Forchlorfenuron (Φορκλορφενουρόν) 1%

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγ. σύνθεση: forchlorfenuron 1% β/ο
βοηθ.ουσίες 98,8% β/β

Αριθμ. Εγκρίσεως κυκλοφορίας:
8181/30-05-2008

**Φυτορρυθμιστικό σκεύασμα που αυξάνει
το μέγεθος των καρπών του ακτινιδίου και του αμπελιού
(επιτραπέζια ποικιλία σουλτανίνα)**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Ερεθίζει τα μάτια
και το δέρμα.
Υποποπο καρκινογόνωσης.



ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
1000 κ.εκ.

UN-Nr. 1170

Κάτοχος της έγκρισης-
Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση:
AlzChem Trostberg GmbH
CHEMIEPARK TROSTBERG
Dr.-Albert-Frank-Str 32
83308 Trostberg, Γερμανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρσούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900-9
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 203, ΒΙ.Π.Ε.Θ, 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλida Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380. 22.008-9

Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία :

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά ζωοτροφές • Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο • Μακριά από πηγές ανάφλεξης. • Απαγορεύεται το κάπνισμα! Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή δείξτε το δοχείο αυτό ή την ετικέτα. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά το ψεκάσμο.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες-Αντιδοτο: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα. Πλύνετε το δέρμα και τα μαλλιά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση αδιαθεσίας από εισπνοή ψεκαστικού υγρού. Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, συμβουλευτείτε γιατρό. Αν πέσει στα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό. Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε ποτέ εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον.
Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: δεν ορίζεται (καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής)
Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος : Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια στην αρχική απαρτίωση συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές θερμότητας.



Αρ. παρτίδας / Παρασκευής-Ημ.

Λήξης-Ημ.