



Stroby® 50 WG

Kresoxim-methyl (Κρεζοξίμ-μεθύλ)

Εναιωρηματοποιησιμοι Κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Kresoxim-methyl 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες 47,4% β/β
(χημική ομάδα δρώντος συστατικού:
στρομπιλουρίνες)

**Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική ή/και
θεραπευτική δράση, καθώς και αξιόλογη διάρκεια δράσης
(περίπου 15 ημέρες).**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Ύποπτο καρκινογένεσης.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 6856/10-4-2002

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **100** γραμ.

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** BASF SE, Γερμανία
**ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΣΗΜΑΝΣΗ:** BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 15343 Αγία Παρασκευή,
τηλ: 210 6860130, www.basf-agro.gr



*Σήμα Κατατεθέν BASF

81074141 GR 1023

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον.
„Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης“.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα, κρατώντας

τα βλέφαρα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε αρκετό νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός αν σας δοθεί τέτοια εντολή από κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό και μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του ή αν έχει σπασμούς.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

**ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

**Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη
συσκευασία του.**

**Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να
αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων
από τα επιφανειακά ύδατα.**

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το STROBY 50 WG δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου καθώς και την παραγωγή σπορίων. Εμφανίζει διελασματική και τοπικά διεισδυτική δράση και η αποτελεσματικότητά του δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Διαλύουμε το σκεύασμα σε λίγο νερό. Στη συνέχεια αδειάζουμε το μίγμα στο μισογεμισμένο με νερό βυτίο με συνεχή ανάδευση και

απογεμίζουμε το βυτίο με νερό.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

- **Αμπέλι – Ωίδιο (*Uncinula necator*).** Δόση 20 γρ./στρέμμα, με 30 – 150 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, 3. Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοί, ξεκινώντας πριν από την άνθηση, με μεσοδιαστήματα 12 – 14 ημερών.
- **Μηλιά – Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*), Ωίδιο (*Podosphaera leucotricha*)** Δόση 20 γρ./στρέμμα, με 100 – 250 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, 3 ή 4, εφόσον ο συνολικός αριθμός επεμβάσεων για το φουζικλάδιο στην περιοχή ξεπερνά τις 11 ανά καλλιεργητική περίοδο. Ο πρώτος ψεκασμός πρέπει να γίνεται στο χρονικό διάστημα που τα δέντρα βρίσκονται μεταξύ του σταδίου της πράσινης κορυφής έως την πρώτη ανάπτυξη των καρπών και οι επόμενοι να ακολουθούν με μεσοδιαστήματα 12 – 14 ημερών.
- **Ελιά (Βρώσιμη, Ελαιοποίησιμη) – Κυκλοκόνιο (*Spilocaea oleagina*).** Δόση 10 – 20 γρ./στρέμμα, με 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο 2 για τις βρώσιμες και 3 για τις ελαιοποίησιμες ελιές. Έναρξη ψεκασμών μετά τη συλλογή

του ελαιοκάρπου όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, χωρίς να υπερβεί η δόση τα 20 γρ./ στρέμμα σκευάσματος ανά εφαρμογή. Στις βρώσιμες ελιές οι εφαρμογές ξεκινούν μετά τη συγκομιδή και σταματούν πριν την επόμενη άνθηση (κρόκιασμα). Στις ελαιοποιήσιμες κατά μέγιστο 2 εφαρμογές μετά τη συλλογή των καρπών και πριν την άνθηση (Χειμώνας – Άνοιξη) και 1 εφαρμογή όταν ο ελαιόκαρπος είναι παρών (Φθινόπωρο – Χειμώνας).

Παρατηρήσεις

1. Η μικρή δόση στην ελιά συνιστάται για μείγματα με εγκεκριμένα σκευάσματα οργανικού χαλκού και η μεγάλη όταν το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο του.
2. Εφόσον υπάρχει σύστημα αγροτικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις.
3. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ανθεκτικότητας στα παθογόνα στόχους συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις **συνεχόμενες** (μέχρι 3) **ή απλές** (σε εναλλαγή ή σε μίγμα με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλουρινών (π.χ. azoxystrobin) ή οξαζολιδινιδίων (π.χ. famoxadone) και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτές). Στην περίπτωση που οι αγροτικές προειδοποιήσεις συστήνουν

θεραπευτικές επεμβάσεις για το φουζικλάδιο στη μηλιά, **τότε μόνο (κατ' εξαίρεση)**, μπορεί το σκεύασμα να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά.

4. **Να μην διενεργούνται θεραπευτικές επεμβάσεις, εκτός αν συστήνονται από τις αγροτικές προειδοποιήσεις.**
5. Να μην χρησιμοποιείται σε αμμώδεις περιοχές με ψυχρά κλίματα και υψηλή βροχόπτωση.
6. Να μην εφαρμόζεται σε αμπελώνες ή μηλεώνες που χρησιμοποιούνται για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μπορεί να συνδυαστεί με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλουρινών (π.χ. azoxystrobin) ή οξαζολιδινιδίων (π.χ. famoxadone) και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτές.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: Η επανείσοδος σε ψεκασμένες καλλιέργειες είναι δυνατή αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες):

Αμπέλι: 35. Μηλιά: 28. Ελιά, Ελαιοποιήσιμη: 30. Ελιά, Βρώσιμη: –.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Για το προϊόν, γίνεται καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Συστήνεται η καύση τους σε κατάλληλους κλιβάνους, όπως και για το φυτοπροστατευτικό προϊόν. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης 1100°C.