

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου. • Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση αναπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κάντε τεχνητή αναπνοή σε περίπτωση που δεν αναπνέει. Σε περίπτωση κατάποσης: Δώστε 2 ποτήρια νερό. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως γιατρό. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Υπάρχει στο σκεύασμα πετρελαϊκός διαλύτης. Πιθανόν να χρειαστεί πλύση στομάχου.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 - 77.93.777**

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική (κλειστή) συσκευασία του. Γειώνετε όλες τις μεταλλικές συσκευασίες κατά την αποθήκευση και το χειρισμό τους. Αποφεύγετε τις πηγές σπινθήρων. Μακριά από υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. σωληνώσεις ατμού, ακτινοβολία), από πηγές ανάφλεξης και από ενεργά υλικά. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



SYSTHANE® 24 EC

Myclobutanil (μικλομπουτανίλ)

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: myclobutanil 24% β/ο (χημική ομάδα τριαζόλες), Βοηθητικές ουσίες 73,8% β/β.

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Χη

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Εύφλεκτο.
- Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
- Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
- Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.
- Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 6795 / 29-2-2000

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 200 κ. εκ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Dow AgroSciences LLC, Η.Π.Α.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Dow AgroSciences Ltd., Ηνωμένο Βασίλειο.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Α. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Dow AgroSciences, Italia
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Σίνδος, Θεσσαλονίκη.
©Σήμα κατατεθέν Dow AgroSciences

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ (στα 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού) – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΜΗΛΟΕΙΔΗ – Μηλιά: Για ιώδιο (*Podospaera leucotricha*) και φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*) 15-20 κ.εκ., 4 εφαρμογές στα στάδια πράσινης και ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλων και 10-15 ημέρες αργότερα (καρπιδίο). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-200 λίτρα ανά στρέμμα. **Αχλαδιά, Μουσμουλιά:** Για φουζικλάδιο (*Venturia pirina*, *Fusicladium eriobotryae*) 15-20 κ.εκ., 4 εφαρμογές στα στάδια πράσινης και λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 15-20 ημέρες αργότερα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-200 λίτρα ανά στρέμμα. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ – Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Νεκταρινιά:** Για ιώδιο (*Podospaera oxycanthae*, *Sphaerotheca pannosa*) 15-20 κ.εκ., η πρώτη εφαρμογή γίνεται στην πτώση των πετάλων, η δεύτερη στη απόσπαση του κάλυκα και η τρίτη 20 ημέρες αργότερα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 150-250 λίτρα ανά στρέμμα. **ΑΜΠΕΛΙ:** Για ιώδιο (*Uncinula necator*) 8-12 κ.εκ., μία βασική εφαρμογή την άνοιξη όταν έχουν εκπτυχθεί 2-3 φύλλα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-150 λίτρα ανά στρέμμα. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ – Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι:** Για ιώδιο (*Sphaerotheca sp.*, *Erysiphe sp.*, *Oidium sp.*) 20-25 κ.εκ., εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα ανά στρέμμα. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ – Τριανταφυλλιά:** Για ιώδιο (*Sphaerotheca pannosa*) και μελανή κηλίδωση (*Diplocarpon rosae*) 20-25 κ.εκ., εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα ανά στρέμμα. **Γαρυφαλλιά:** Για σκωρίαση (*Phragmidium sp.*) 20-25 κ.εκ., εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα ανά στρέμμα. **ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:**

Μηλοειδή 4, Πυρηνόκαρπα 3, Αμπέλι 3, Κολοκυνθοειδή 5, Καλλωπιστικά 5.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτικές και η μεγάλη για θεραπευτικές εφαρμογές. 2. Στις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι και κολοκυνθοειδή υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: 21 ημέρες. Κολοκυνθοειδή: 7 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.



031204α