

# Systiva® 33.3 FS

**Fluxargoxad (φλουξαπροζάντ)**

**Αιώρημα για επένδυση σπόρου (FS)**

**Εγγυημένη σύνθεση:** Fluxargoxad 33.3 % β/ο (ομάδα καρβοξαμικά)  
Βοηθητικές ουσίες 69.81% β/β

**Μυκητοκτόνο, επενδυτικό σπόρων για την αντιμετώπιση  
μυκητολογικών ασθενειών στα σιτηρά.**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

- Ύποπτο καρκινογένεσης.
- Προορίζεται μόνο για χρήση από τις εταιρείες σπόρων.

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:** 60381/12-9-2013

**ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

Περιεχόμενο: **10** λίτρα

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:**  
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,  
153 43 Αγ. Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130,  
www.basf-agro.gr.



**Αριθμός Παρτίδας:** Ως άνω μέρος συσκευασίας  
**Ημερομηνία Παραγωγής:** Ως άνω μέρος συσκευασίας  
**Ημερομηνία Λήξης:** Ως άνω μέρος συσκευασίας



**Xn**



**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ**

**N**



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο και την ετικέτα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

*«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».*

## ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε 200 – 300 ml νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

**ΓΙΑΤΡΟΙ:** Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777**

**ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ  
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

**ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Επένδυση σπόρων σιτηρών πριν τη σπορά. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αυτοματοποιημένα συστήματα κλειστού κύκλου, διαφορετικά φοράτε μάσκα με φίλτρα FFP3 σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των σπόρων.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ:** (αναφέρονται σε κ.εκ. σκευάσματος)

**ΚΡΙΘΑΡΙ:** Για την καταπολέμηση της **Καστανής Σκωρίασης**, της **Δικτυωτής κηλίδωσης**, της **Ραβδωτής κηλίδωσης**, της **Ρυγχοσπορίωσης**, του **Ωιδίου**, της **Ραμουλάριας**, της **Σήψης**, της **Φουζαρίωσης** και του **Ρυμνου Άνθρακα**. Δόση: 150 κ.εκ./100 κιλά σπόρου. Συστήνεται επένδυση σπόρου πριν τη σπορά. Όγκος ψεκαστικού υγρού: το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο ή διαλυτό σε νερό με μέγιστη αναλογία 1:10 (προϊόν:νερό). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

**ΣΙΤΑΡΙ (σκληρό, μαλακό):** Για την καταπολέμηση της **Σεπτορίωσης**, του **Ωιδίου**, της **Καστανής Σκωρίασης**, της **Σκωρίασης**, της **Σήψης**, της **Φουζαρίωσης** και του **Δαυλίτη**. Δόση: 100 – 150 κ. εκ./100 κιλά σπόρου. Συστήνεται επένδυση σπόρου πριν τη σπορά. Όγκος ψεκαστικού υγρού: το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο ή διαλυτό σε νερό με μέγιστη αναλογία 1:10 (προϊόν:νερό). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

**ΣΙΚΑΛΗ - ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ - ΒΡΩΜΗ:** Για την καταπολέμηση της **Σήψης** και της **Φουζαρίωσης**. Δόση: 100 – 150 κ.εκ./100 κιλά σπόρου. Συστήνεται επένδυση σπόρου πριν τη σπορά. Όγκος ψεκαστικού υγρού: το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτο ή διαλυτό σε νερό με μέγιστη αναλογία 1:10 (προϊόν:νερό). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

- Χρησιμοποιείτε την υψηλότερη δοσολογία για τις ποικιλίες που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις ανωτέρω ασθένειες.
- Η δόση σκευάσματος ανά στρέμμα για όλες τις καλλιέργειες είναι: 27 γρ.

#### **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:**

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Σε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των ασθενειών των φύλλων μπορεί να καταστούν αναγκαίες εφαρμογές στην καλλιέργεια για να διατηρηθεί η υγιεινή σε όλο τον κύκλο βλάστησης. Στις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται επενδεδυμένοι σπόροι με fluxarogoxad πρέπει να πραγματοποιείται το πολύ μία επιπλέον εφαρμογή με μυκητοκτόνα που ανήκουν στους Παρεμποδιστές της Αφυδρογονάσης του Ηλεκτρικού Οξέος (Succinate dehydrogenase inhibitors - SDHI).

#### **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:-**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για διαχείριση σαν επικίνδυνα απόβλητα. Το προϊόν εξουδετερώνεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά (περίπου 1100 °C για 2 δευτερόλεπτα).

#### **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασίες 5° έως 35 °C.