

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: •Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. •Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης δώστε στον παθόντα να πιει 1-2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό ενεργώντας στο βάθος του φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο. Επαναλάβετε μέχρι της εμφάνισης καθαρών εμεσμάτων. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε παθόντα που δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύντε αμέσως τη δερματική περιοχή στην οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε αμέσως τα λερωμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση αναπνευστικής δυσχέρειας μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα, μακριά από την περιοχή που εφαρμόστηκε το σκεύασμα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης
Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων : 210.77.93.777

**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον.

Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΗΜ.ΛΗΞΗΣ, ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε άνω μέρος φιάλης

TACHIGAREN^{36SL}

Hymexazol (Χιμεξαζόλ 36%) Πυκνό διάλυμα(SL)

Εγ. σύνθεση: Hymexazol 36% β/ο
(χημική ομάδα isoxazoles)
Βοηθ.ουσίες 69,5%β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφ:
6699/1.4.03

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και
θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του μύκητα
*Fusarium oxysporum f.sp.Radicis-lycopersici***

Το hymexazol παρουσιάζει αποπ्लाστική κυρίως
κίνηση μέσα στους φυτικούς ιστούς

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΩΜΕΝΟ
& ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**Περιεχόμενο:
1 ΛΙΤΡΟ**

Κάτοχος της έγκρισης :
Sumi Agro Europe Ltd,
Vintners Place,
68 Upper Thames Street, London EC4V 3BJ
Ηνωμένο Βασίλειο
Παρασκευαστής :
Mitsui Chemicals Agro Inc. , Ιαπωνία

Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση-
Εργοστάσιο συσκευασίας-
Διανομέας:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμιγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλida Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΑ - ΔΟΣΕΙΣ

Τομάτα Θερμοκηπίου: Σήψη λαϊμού και ριζών.

Προληπτικά : Δόση 0,25 κ.εκ. σκευάσματος / φυτό εφόσον ο αριθμός των φυτών / στρέμμα είναι 2000 ή 0,5 λίτρα / στρέμμα με 400 λίτρα νερό/στρέμμα. Πρώτη επέμβαση 8 ημέρες μετά τη μεταφύτευση των φυτών και επανάληψη κάθε 12 ημέρες. Αριθμός επεμβάσεων: 4 - 5 (σε θερμοκήπια που υπάρχει ιστορικό εμφάνισης της ασθένειας.)

Θεραπευτικά: Δόση 0,75 κ.εκ. σκευάσματος/φυτό εφόσον ο αριθμός των φυτών/στρέμμα είναι 2000 ή 1,5 λίτρο / στρέμμα με 400 λίτρα νερό/στρέμμα. Πρώτη επέμβαση με τα πρώτα συμπτώματα προσβολής και επανάληψη μετά από 15 ημέρες. Αριθμός επεμβάσεων: 1 - 2.

Παρατήρηση: Να μην υπερβαίνετε ανά καλλιεργητική περίοδο τη μέγιστη ποσότητα των 3 λίτρων σκευάσματος ή 1,08 κιλά δραστικής ουσίας (hymexazol) ανά στρέμμα.

Τρόπος εφαρμογής:

Ριζοπάτσημα που μπορεί να γίνει και με την προσθήκη του σκευάσματος στο σύστημα στάγδην άρδευσης ρυθμίζοντας έτσι την διάλυση ώστε να πέφτουν 200 κ.εκ. διαλύματος ανά φυτό.

Πότισμα με ψεκαστήρα με αυλό και ένα μπεκ ή χωρίς μπεκ και χαμηλή πίεση (1-2 bars). Πλάτος εφαρμογής 20-40 εκ.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Προσθέτουμε τη συνιστώμενη δόση στην ανάλογη ποσότητα νερού και αφού αναδεύσουμε αρχίζουμε την εφαρμογή.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις στην καλλιέργεια την τομάτας.

Συνδυαστικότητα: Δεν προτείνεται η συνδυασμένη εφαρμογή του με άλλα σκευάσματα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 15 ημέρες.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε καλά το δοχείο εφαρμογής με νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού

προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε χώρο ξηρό και δροσερό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια.

