

Ακαρεοκτόνο

TENOR

10WP

YPSILON®



YPSILON®

TENOR 10WP

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (γραμ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρό)	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤ. ΥΓΡΟΥ (λίτρ./στρ.)	ΔΟΣΕΙΣ (γραμ./ στρ.)	Μέγιστος αριθμός επεμβά- σεων ανά καλλιερ- γητική περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1), (2), (6)
Μηλιά, Αχλαδιά	- Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) - Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	30-50	100-200	30 - 100	1	Στο στάδιο της ρόδινης κορυφής (3), (4).
Ροδακινιά	- Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) - Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	30-50	150-250	45 - 125	1	Στο στάδιο της ρόδινης κορυφής (3), (4).
Αμπέλι	- Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) - Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	30-50 + ακμαιο- κτόνο	50-150	15 - 75	1	Άνοιξη ή σε περίπτωση πρώιμου καλοκαιριού, 2-3 εβδομάδες μετά την άνθηση μόλις φανούν οι πρώτες κνητές μορφές ακάρεων (4)
Βαμβάκι	- Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 + Ακμαιο- κτόνο (στα 2/3 της πλήρους δοσολογίας)	50-80	20 - 32	1	Όταν τα φυτά έχουν ύψος 40 εκ.ατ. (5)

Παρατηρήσεις:

1. Να χρησιμοποιείται προτού φθάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου.
2. Επειδή το δραστικό συστατικό έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια, δύο μηνών, συνήθως δεν απαιτείται περισσότερο από μια εφαρμογή το χρόνο.
3. Χρησιμοποιείται σε ένα μόνο ψεκασμό το έτος από την έναρξη της εκκόλαψης των χειμερινών αυγών.
4. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο ψεκασμός αυτός δεν γίνει αρκετά νωρίς και έχουμε μεγάλο αριθμό ακμαίων, να χρησιμοποιείται μίγμα του σκευάσματος με ένα συμβατό ακμαιοκτόνο.
5. Επειδή το σκεύασμα πρέπει να συνδυάζεται με ακμαιοκτόνο σκεύασμα δεν είναι απαραίτητο να ψεκάζουμε νωρίς, δηλαδή πριν ορισμένα άτομα του τετρανύχου φθάσουν στο στάδιο του ακμαίου.
6. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε μετά την εφαρμογή με το σκεύασμα, ακαρεοκτόνο με δραστική ουσία clofentezine ή και το αντίθετο, στην ίδια καλλιεργητική περίοδο, προς αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.



TENOR
10WP

Ακαρεοκτόνο
Βρέξιμη σκόνη (WP)

Προφυλάξεις:

●Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
●Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
●Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ●Μην αναπνέετε τη σκόνη. ●Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. ●Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. ●Να φοράτε κατάλληλα γάντια. ●Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. ●Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση. ●Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. ●Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας. ●Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο:
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
**Τηλέφωνο Κέντρου
Δηλητηριάσεων:210 77 93 777**

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Επιβλαβές για την εδαφική πανίδα.
Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες



YPSILON®

Τενόρ

TENOR
10WP

Ακαρεοκτόνο

Βρέξιμη σκόνη (WP)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Hexythiazox 10% (β/β)
Βοηθητικές ουσίες 89,75% β/β

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ακαρεοκτόνο επαφής και
στομάχου με δράση ωοκτόνο,
προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο.

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας : 2174/02.12.2008

Κάτοχος της έγκρισης:
SAPEC AGRO S.A., Πορτογαλία.

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία & σήμανση:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Καθαρό βάρος: 80 γραμ.



TENOR
10WP

Ακαρεοκτόνο
Βρέξιμη σκόνη (WP)

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι 35 ημέρες
Ροδακινιά 14 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης.Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως μεγάλου όγκου με ψεκαστικά μέσα υψηλής πίεσης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: