

ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG

Τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: Για αφίδες (*Dysaphis plantaginea*, *Aphis pomi*, *Dysaphis pyri*) με 14γρ./στρέμμα. Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής, στην αρχή της άνοιξης, όταν αναπτύσσονται οι πρώτοι βλαστοί. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Για αφίδες (*Myzus persicae*, *Anuraphis persicae-niger*, *Hyalopterus spp.*) με 14 γρ./στρέμμα. Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής, στην αρχή της άνοιξης, όταν αναπτύσσονται οι πρώτοι βλαστοί. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ - ΠΕΠΟΝΙΑ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ, ΑΓΓΟΥΡΙΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ (Αγρού & Θερμοκηπίου): Για αφίδες (*Aphis gossypii*) με 10 γρ./στρέμμα. Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φυλλών έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθρόποδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες.
- Επεμβάσεις με ΤΕΡΡΕΚΙ νωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι σε χαμηλή επίπεδο.
- Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με ΤΕΡΡΕΚΙ. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ηχηκών ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με το flonicamid.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμός καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- Μήλα, Αχλάδια: 21 ημέρες.
- Ροδάκινα: 14 ημέρες.
- Πεπόνια, Καρπούζια, Αγγούρια, Κολοκύθες, Κολοκυθάκια: 1 ημέρα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνονται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυντος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκεύασματος:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε στην
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: επιφάνεια του κουτιού



ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG

flonicamid - φλονικαμιντ-
(ομάδα πυριδινόκαρβοξαμιδίων)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:
flonicamid: 50% β/β
βοηθητικές ουσίες: 47,92% β/β

Διασυστηματικό εντομοκτόνο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

Καθαρό βάρος: 2X20 γραμ.

Εργοστάσιο παρασκευής σκευάσματος:
ISHIHARA SANGYO KAISHA Ltd., Ιαπωνία
Παρασκευαστής σκευάσματος - Κάτοχος της έγκρισης:
ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A., Βέλγιο

Υπεύθυνος επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση - Εργοστάσιο συσκευασίας:

ΚΑΙ.Ευθυμιάδη ΟΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@eftymiadis.gr

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση κατάποσης: ζητείστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μη χορηγήστε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 77 93 777

Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνους μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.