

TETRAMOR 6,9EW

Fenoxaprop-p-ethyl (φενοξαπρόπ-π-εθύλ) ομάδα Aryloxyphenoxy propionic acid

Εγγυημένη Σύνθεση:

Δραστική ουσία: fenoxaprop-P-ethyl 6,9 % β/ο

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: Clonquitoset-mexyl 3,45% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 93.09% β/β

Περιέχει ως διαλύτη αρωματικούς υδρογονάνθρακες

ΕΝΔΙΩΡΗΜΑ, ΛΑΔΙ ΣΕ ΝΕΡΟ (EW)

Αρ. άδειας διάθεσης στην αγορά:

70.052/22-7-2013

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι.

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ερεθίζει το δέρμα
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση
σε επαφή με το δέρμα.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
5 ΛΙΤΡΑ**

Κάτοχος της άδειας- CHEMINOVA AGRO SA,
Paseo De La Castellana 257, 5o -28046, Madrid, Spain

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
του προϊόντος στην αγορά:



ΑΘΗΝΑ: Φλέμιγγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σινδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380. 22.008-9
e-mail: info @hellafarm.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι. Το TETRAMOR 6,9 EW απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και τον βλαστό και μεταφέρεται στις ρίζες και τα ριζώματα. Μετά την εφαρμογή οι νεότεροι ιστοί των φύλλων γίνονται χλωρωτικοί (κίτρινοι) ή νεκρωτικοί (καφέ) και τα φύλλα αποσχίζονται εύκολα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νέκρωση των ζιζανίων.

Καλλιέργεια, στόχος και δοσολογία: Καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και μαλακό) με δόση 100-120 κ.εκ./ στρέμμα και στο κριθάρι με δόση 100 κ.εκ./ στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10-30 λίτρα/ στρέμμα. **Τρόπος χρήσης και χρόνος εφαρμογής:** Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιερητική περίοδο: 1**

Παρατηρήσεις: 1) Το TETRAMOR 6,9 EW εφαρμόζεται από το στάδιο των 2 φύλλων των ζιζανίων μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου. Ειδικά στη φάλαρη συνιστάται να εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του αδελφώματος. 2) Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια ξεπεράσουν το στάδιο του αδελφώματος καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση της φάλαρης. 3) Να μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

Ευαίσθητα ζιζάνια: Σετάρια (Setaria spp.) - Τραχεία λιβαδοπόα (Poa trivialis) - Αλεπονουρά (Alopecurus spp.) - Αγριοβρώμη (Avena spp.) - Φάλαρη (Phalaris spp.) - Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με 10-30 λίτρα νερό ανά στρέμμα με πίεση 2,5-3 atm. (38-45 PSI) και μπεκ τύπου σκούπας. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα 3/4 με νερό. Ανακινείστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Στην περίπτωση που αδειάζει η φιάλη, τότε ξεπλύνετε τρεις φορές και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες βρώμης. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια καλλιερητική περίοδο μπορούν να σπαρούν αραβόσιτος και σόργο αφού μεσολαβήσουν τρεις (3) εβδομάδες μετά την εφαρμογή του TETRAMOR 6,9 EW.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Δεν βρίσκει εφαρμογή (τελευταία επέμβαση μέχρι και τον σχηματισμό του δεύτερου κόμβου των καλλιερειών). **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Στην αρχική του απαραβίαση συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30 °C) και καλά αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα αναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: ● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτροφές ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ● Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. ● Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. «Να φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά τις διάφορες φάσεις χρήσης του σκευάσματος.» **“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”** «Δεν θα πρέπει να εισέλθετε στον αγρό που έχει ψεκαστεί πριν από 48 ώρες από την εφαρμογή»

Πρώτες βοήθειες:Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Αφαιρέστε τους φακούς επαφής και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός και επιμένει, καλέστε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Θεραπεία συμπτωματική. Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα (μεγαλύτερη από μια γουλιά) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Το σκεύασμα περιέχει ως διαλύτη αρωματικούς υδρογονάνθρακες **Αντίδοτο: Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα:** Γαστρεντερικές διαταραχές, εμετός διάρροια. **Θεραπεία:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. **Αντένδειξη:** παράγωγα της αδρεναλίνης. Παρακολούθηση λειτουργίας νεφρών, ήπατος και παγκρέατος. Σε περίπτωση κατάποσης κάνετε πλύση στομάχου εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα μόνο στις 2 πρώτες ώρες. Ωστόσο, συνιστάται σε κάθε περίπτωση η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικό νάτριο. Εάν έχει καταποθεί ποσότητα ίσης ή μεγαλύτερης μιας γουλιάς, τα ακόλουθα μέτρα συνιστάται να ακολουθηθούν: Εξάλειψη με διάλυση (εξαναγκασμένη αλκαλική διούρηση). **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 m

Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 m από τις γειτονικές καλλιέργειες