

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος. • Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών προσώπου.

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΩΤΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777



Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπηση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Δύο (2) χρόνια στην αρχική του, καλά κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, προστατευμένο από αεριζόμενο.

Ημερία παρασκευής: βλέπε φύλλο
Αριθμός παρτίδας:



THERBONAL 28.75 EC

ετοfenproх (ετοφενπρόξ)

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: ετοfenproх 28,75% β/ο
βοηθ. ουσίες 69,29% β/β

**Μη εστερικό
πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο**

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
- Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.
- Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
- Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθμ. Εγκρισ. Κυκλοφορίας: 14327/ 16-3-2009

Περιεχόμενο: 500 κ.εκ.

Παρασκευαστής: Mitsui Chemicals Agro, Inc., Ιαπωνία
Κάτοχος της άδειας - Εργαστάσιο συσκευασίας - Διανομέας:

Κ.Λ. Ευθυμιάδης ο.ε.ε.

Β.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μη εστερικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου. Δρά στο νευρικό σύστημα του εντόμου-στόχου και συγκεντρώμενα στη ροή των ιόντων νατρίου στις μεμβράνες των νευρικών αξόνων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΗΛΙΑ: Για Καρτόκαφα (*Cydia pomonella*) στη δόση 50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού, με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Για Φυλλοδέττη (*Adoxophyes orana*) στη δόση 50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού, με 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2.

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιες και οινολογικές ποικιλίες): Για Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*) στη δόση 50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού, με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΛΑΧΑΝΟ: Για Περιίδα (*Pieris brassicae*) στη δόση 50 κ.εκ./στρέμμα, με 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2.

Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες. Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων όπου αυτές εφαρμόζονται.

ΑΚΤΙΝΙΑΔΑ(*): Για Μετκάφα (*Metcalfa pruinosa*) στη δόση 50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού, με 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1. Να διενεργείται μια εφαρμογή με την εμφάνιση των επιβλαβών εντόμων κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου. Συνιστάται η παρακολούθηση της πορείας των ενδηλίων του *Metcalfa pruinosa* καθώς και του παραιοειδούς *Neodryinus typhlocybae* όπου έχει εγκατασταθεί.

(*Παρατήρηση: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φωτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώνουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδύοντες. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδύση.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

-Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσιικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

-Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. -Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.

-Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με THERBONAL. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες.

-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.

-Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στην συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στην ετικέτα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- Μήλα, Ροδάκινια, Λάχανο: 7 ημέρες - Σταφύλια: 14 ημέρες - Ακτινίδια: Μη εφαρμοσμένο