

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Μηλιά, Αχλαδιά: Για *Ωίδιο (Podosphaera leucotricha)*: 400 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού πριν την άνθηση και 200-300 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού μετά την άνθηση ή 800 γρ. σκ./στρέμμα (max) πριν την άνθηση και 600 γρ. σκ./στρέμμα (max) μετά την άνθηση. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρέμμα.
Στα στάδια πράσινης και ροδίνης κορυφής (πριν την άνθηση). Στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθeneιών (μετά την άνθηση).
Για Φουζικλάδιο (*Venturia inaequalis*): 500 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 1000 γρ. σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρέμμα. Στα στάδια πράσινης και ροδίνης κορυφής, στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
Ροδακινιά, Βερικοκιά: Για *Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa)*: 300-400 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 1000 γρ. σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 λίτρα/στρέμμα.
Στα στάδια πτώσης πετάλων, απόσπασης του κάλυκα και στάδιο καρπιδίου και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
Αμπέλι: Για *Ωίδιο (Uncinula necator)*: α) 200-400 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 600 γρ. σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. Όταν οι βήαστοι έχουν μήκος περίπου 10 εκατ. β) 100-200 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 300 γρ. σκ./στρέμμα (max). Κατά την άνθηση, μετά το δέσιμο των ραγών και κάθε 15-20 μέρες μέχρι το στάδιο του «γυαλισματος» των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής.
Για *Ερίνωση (Eriophyes vitis)*: 1000 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 1500 γρ. σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. Με την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών.
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά: Για *Ωίδιο (Leveillula taurica)*: 200-300 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 300 γρ. σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.
Αγγούρι, κολλοκύθι, πεπόνι, καρπούζι: Για *Ωίδιο (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca Fuliginea)*: 200-300 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 240 γρ. σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.
Τριανταφυλλιά: Για *Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa)*: 200-300 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 150 γρ. σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα. Μόλις οι βήαστοι αποκτήσουν μήκος 10-15 εκατ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Έως 4 εφαρμογές
Παρατηρήσεις:
1. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθeneιών.
3. Στις καλλιεργείες μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, βερικοκιά, αμπέλι, λαχανικά, να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
4. Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18 °C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 °C.



Αρ. Παρτίδας: Βλέπε φιάλη
Ημ/νία Παραγωγής: Βλέπε φιάλη

L164854 GREC/4Q



Thiovit®
80 WG

syngenta®

Sulphur 80% (Θειάφι)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ. Τροφ.: 6798/29-2-2000

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Sulphur 80% β/β

Βοηθητικές ουσίες 19,2% β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ

ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Syngenta Hellas A.E.B.E.

Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Chemark Kft., Ουγγαρία

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 kg e

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ:
• Διατηρήστε το μόνο στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μακριά από θερμότητα. • Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό διατηρώντας τα βλέφαρα ανοικτά. • Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν βερωθεί. Αν πάρουν φωτιά τα ρούχα σας και είναι ποτισμένα με θειάφι κινδυνεύετε να πάθετε πολύ σοβαρά εγκαύματα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. • Φοράτε κατάλληλα γάντια και γυαλιά με πλαστικό σκελετό. • Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με θάψιμο. • Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην αναπνέετε τους καπνούς.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε δύο ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό με το δάκτυλο. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα και μη προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡ.: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο, αναδεύοντας συνέχεια. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την Παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.
Παρατήρηση: Επειδή το θειάφι, διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με ορυκτέλαιο καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγούμενως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα:

Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή ποττού, προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28 °C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολλοκυνθοειδή και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς και βερικοκιάς.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Αμπέλι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολλοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι: 7 ημέρες.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος –

Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο καλά αεριζόμενο, προσταγμένο από απευθείας έκθεση στον ήλιο και από υγρασία και μακριά από εστίες φωτιάς, μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.