

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Να φοράτε κατάλληλα γάντια και κατάλληλες μάσκες. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλες μάσκες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα, διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα από τον χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.
Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Σ:

Δύο χρόνια στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων και υδροχαρών. Απορροφάται από το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται γρήγορα σε ολόκληρο φυτό. Σε βιοχημικό επίπεδο εμποδίζει τη βιοσύνθεση αρωματικών αμινοξέων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός φυλλώματος ζιζανίων με 20-40 λίτ. νερό/στρ. και χωρίς να έρθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών, προς αποφυγή φυτοτοξικότητας και ανισορροπίας υπολειμμάτων. Να αποφεύγεται η επαφή ακόμα και με ευλοιοποιημένους κορμούς δένδρων ιδίως πυρηνοκαρπων. Σε γραμμικές καλλιέργειες εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Με συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Αφήστε να περάσουν μετά τον ψεκασμό τουλάχιστον 7 ημέρες για τα ετήσια ζιζάνια ή 14 για τα πολυετή ζιζάνια πριν από την κατάργηση του εδάφους ή την επαναφύτευση. Δεν επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΔΗ:

7 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες.

Καλλιηργήστε εκτάσεις: ---

**Αριθμ. πατάδας: Βλέπε φύλλο
Ημ. παραγωγής: Βλέπε φύλλο**

L165157 GREC/5Q

TouchdownPremium®
36 SL

syngenta.

Glyphosate (γκλυφοζέιτ)
(ομάδα φώσφονογλυφινικών)

Αρ. Εγκρ. κυκλ. Υπ. Αγροτ. Ανάπτ.:
7804/8-12-2006

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Glyphosate (υπό μορφή
αμμωνιακού άλατος): 36% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 70,6% β/β
Πυκνό διάλυμα (SL)

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό
μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση ετησίων
και πολυετών αγρωστωδών
και πλατύφυλλων ζιζανίων
και υδροχαρών.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ


Προσρίζεται μόνο για
επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**
Λ.Ανθούσης, 153 49 Ανθούσα, Αττική,
Τηλ.: 210 6666612-13
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
www.syngenta.gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: **Syngenta Hellas A.E.B.E.**
Οινόφυτα, Βοιωτίας

Product name marked on ®, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PÜRPURKREIS
are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Επεριδιοσολή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ Φρουτ, Κίτρα), **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά), **Πυρηνόκαρπα** (Βερυκοκιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά, Κερασιά), **Αμυγλιά επιτραπέζια και ονομαστικά, Ελιές ελαιολαίμες και επιτραπέζιες** (συμπεριλαμβανομένου μόνο από τα δένδρα), **Βαμβάκι (**), Αγρό μετά την συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατάργηση του εδάφους για σπορά.**

Καταπολέμηση των **Ετήσιων ζιζανίων** (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα).
Δοσολογία : 150-200 κ.εκ.σ.κ./στρ., όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στη ζωνή βλάστησης.

Καταπολέμηση των **Πολυετών ζιζανίων** (**). Δοσολογία : 500-750 κ.εκ.σ.κ./στρ., όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνηση, κατά την άνηση ή λίγο μετά από αυτή. Καταπολέμηση των **Αγριόδα** και των **Περικοκλήδα**, Δοσολογία 750 κ.εκ.σ.κ./στρ., όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνηση, κατά την άνηση ή λίγο μετά από αυτή. Καταπολέμηση των **Βελιούρα**, Δοσολογία 500 κ.εκ.σ.κ./στρ., όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνηση, κατά την άνηση ή λίγο μετά από αυτή. Καταπολέμηση των **Κύληρη**, Δοσολογία: 500-750 κ.εκ.σ.κ./στρ., όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνηση, κατά την άνηση ή λίγο μετά από αυτή.

Καλλιηργήστε εκτάσεις

Καταπολέμηση των **Ετήσιων ζιζανίων** (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα). Δοσολογία 150-200 κ.εκ.σ.κ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στη ζωνή βλάστησης. Καταπολέμηση των **Πολυετών ζιζανίων** (**). Δοσολογία 500-750 κ.εκ.σ.κ./στρ. ανάλογα με το είδος του πολυετούς ζιζανιού, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνηση, κατά την άνηση ή λίγο μετά από αυτή.

Καταπολέμηση τους **Ευλόιδες θάμνους, δένδρα, βότα κλπ** (**). Δοσολογία: 750 κ.εκ.σ.κ./στρ., όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

Κατά μήκος αρδευστικών και στραγγιστικών καναλιών

Καταπολέμηση των **υδροχαρών ζιζανίων** (**). Δοσολογία : 750κ.εκ.σ.κ./στρ., κοντά ή κατά την άνηση των ζιζανίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλες τις χρήσεις το προϊόν εφαρμόζεται 1 φορά ανά καλλιηργητική περίοδο με: 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα.

(*) Για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων απαιτείται **μία εφαρμογή** (χειμώνα-άνοιξη) ή (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιηργία όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης.

(**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται **μία εφαρμογή** όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνηση κατά την άνηση ή λίγο μετά από αυτή.

(***) Με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών.

Παρατηρήσεις: **1.** Για την αγριόδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκατοστά. **2.** Με την άνηση ψεκασμός αν ανανεωθεί βροχή σε 6 ώρες. **3.** Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για απορροπαγωγή. **4.** Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. **5.** Οι πολυετείς καλλιέργειες να είναι ηλικίας άνω των δύο ετών. **6.** Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. **7.** Ο ψεκασμός των ζιζανίων στα αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να είναι κατευθυνόμενος κατά μήκος των όχθων αποφεύγοντας την οποιαδήποτε επαφή του ζιζανιοκτόνου με το νερό. **8. Στα στραγγιστικά κανάλια η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα για τη διάσφραξη της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

