

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
• «Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.» • Αποφύγετε την ελευθερώση του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελητία δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό. Περιέχει αρωματικούς διαλύτες ή/και παράγωγα πετρελαίου.

Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό. Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα ή πνευμονιτίδα.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέουν.

Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Περιέχει αρωματικούς διαλύτες ή/και παράγωγα πετρελαίου.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Να μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε μην στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν ασφάλιστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Περιέχει clodinafop-propargyl και cloquintocet –mexyl.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο αγρωστωδών ζιζανίων στο σιτάρι και τριτκάλε, που απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται στον μερισματογό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και την κυτταρική διαίρεση. Το pinoxaden, ανήκει στη νέα χημική ομάδα των phenylpyrazolin που δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων. Το clodinafop-propargyl, ανήκει στη χημική ομάδα των aryloxyphehoxy propionics παραγώγων που ονομάζονται κοινώς “FOPS”, τα οποία δρουν παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφωτρωτικός ψεκασμός. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με ψεκαστήρες όλων των τύπων και υπεκ τύπου ακούσης. Ψεκασμός υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παροσκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο κατά το 1/2, προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα προϊόντος σε νερό και μετά συμπληρώνουμε μέχρι επάνω το δοχείο με συνεχή ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο περισσότερο από τον χρόνο που απαιτείται για τον ψεκασμό. Να γίνεται πάντα ανάδευση πριν τον ψεκασμό.

Συνδυαστικότητα: Το Traxos να μη συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν 2,4 D ή dicamba επειδή ο συνδυασμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο έλεγχο των αγρωστωδών ζιζανίων.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα μππόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

L175813 GREC/10R



Traxos
60 EC

syngenta®

Pinoxaden + Clodinafop-propargyl

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αρ. Έγκρ. Κυβλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.:
70054/20-09-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Pinoxaden 3% β/ο
Clodinafop Propargyl 3% β/ο
(clonquintocet –mexyl σαν
αντιφυτοτοξικό παράγοντα 0,75% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 93,78% β/β
(συμπεριλαμβανομένου του
αντιφυτοτοξικού παράγοντα)

**Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό
ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο
αγρωστωδών ζιζανίων
στο σιτάρι και τριτκάλε.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση
της συσκευασίας
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες**

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε.

Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Ζίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lte

Χι



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

• Ερεθιστικό στο δέρμα.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

ΓΙΑ ΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Τοξικό στους υδρόβιους
οργανισμούς. Μπορεί να
προκαλέσει μακροχρόνιες
ανεπιθύμητες επιδράσεις
στο υδρόβιο περιβάλλον

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαθίσταται:

• Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα και σπόρους.
• Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. • Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που έχουν διαφορετικό μηχανισμό δράσης και η εφαρμογή κατάλληλων γεωργικών πρακτικών όπως η αμειψισπορά ή η ψευδοσπορά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί στη διαδοχή των καλλιεργειών στην αμειψισπορά κάτω από κανονικές συνθήκες.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιεργείες. Στο τριτκάλε συνιστάται η δοκιμή φυτοτοξικότητας πριν την εφαρμογή.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παροσκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλή αεριζόμενο χώρο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Σιτάρι, Τριτκάλε: Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.

Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Σιτάρι (σιτακό/ σκληρό)	Αίρεπονούρα (Alopecurus Myosuroides)				
Τριτκάλε	Αγριοβρόμη Avena spp (Avena sterilis Avena fatua) Ήρα Lolium spp. Φάληρα Phalaris spp. (Phalaris paradoxa, Phalaris brachystachys Phalaris minor)	100	10-40	Μεταφωτρωτικά, από το 3 ^ο φύλλο της καλλιεργείας μέχρι την πλήρη έκπτυξη του φύλλου σημαία.	1 εφαρμογή

Παρατηρήσεις:

- Εφαρμόστε το προϊόν σε καλλιεργείες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιεργείες που είναι προσβεβλημένες ή είναι ταλαιπωρημένες από το κρύο ή την ξηρασία, γιατί η αποτελεσματικότητά μπορεί να μην είναι η βέλτιστη.
- Η επανειλημμένη χρήση του σκευάσματος ή άλλων ζιζανιοκτόνων με τον ίδιο τρόπο δράσης, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται στα ζιζάνια με ενεργή ανάπτυξη.

Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής:

