

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

•Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας. •Οι εργασίες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΑΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά εξοπλισμένο χώρο και προφυλάξτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασεως καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Χορηγίστε επανειλημμένα ιατρικό άνθρακα με μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγίσετε σιδήρινη εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει γνωστό αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

“Περίεχí clodinafor-propargyl και cloquintocet –mexyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.”

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-50 λίτρα νερό στο όριο (2) ατόμοφυρες (30 PSi) υπό συνεχή ανόδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε με νερό το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/3, προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και μετά συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό, με συνεχή ανόδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος περισσότερο από το χρόνο που απαιτείται για τον ψεκασμό. Να γίνεται πάντα ανόδευση πριν τον ψεκασμό.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξοφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Συνδυαστικότητα: Το TRAXOS ONE, δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν 2,4D ή dicamba καθώς υπάρχει κίνδυνος μειωμένης αποτελεσματικότητας των αγρωστωδών ζιζανίων.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλισή της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τρόπος δράσης: Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και των αμινοξέων με διακλαδιόμενη αλυσίδα ατόμων άνθρακα.

Το **pinoxaden** ανήκει στη χημική ομάδα των φενυλοπυραζολινών που δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

Το **clodinafor-propargyl** ανήκει στη χημική ομάδα των αργλοχρηνοχγ προλιονι παραγόντων που ονομάζονται κοινώς “FOPS”, τα οποία δρουν παρεμποδίζοντας τη συνθεση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

Το **florasulam** ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών-σουλφονιδίων. Αναστέλλει τη δράση του ενζύμου οξεκογολακτική συνθεσάση (acetolactate synthase-ALS), απαραίτητο ένζυμο για την βιοσύνθεση των αμινοξέων με διακλαδιόμενη αλυσίδα ατόμων άνθρακα.

L169958 GREC/12Q



Traxos[®] One

30/30/7,5 EC

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

• Ερεθίζει το δέρμα.
• Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.
• Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

TM



pinoxaden (χημική ομάδα φαινυλοπυραζολίνες), clodinafor-propargyl (χημική ομάδα πυριδιλφαινυλθαιθέρες), florasulam (χημική ομάδα τριαζολοπυριμιδινών-σουλφονιδίων)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αρ. Έγκρ. Κυβ. Υπ. Αγρωτ. Ανάπτ. & Τροφ.: 70007/11-12-2012

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Pinoxaden 3% β/ο
Clodinafor-propargyl 3% β/ο
Florasulam 0,75% β/ο
αντιφυτοτοξικό ουσία
cloquintocet–mexyl 0,75% β/ο
βοηθητικές ουσίες 92,94 % β/β
(συμπεριλαμβανομένου του αντιφυτοτοξικού παράγοντα)

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων αγρωστωδών και ηλιετών ζιζανίων στο σιτάρι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΕ: ΒΙ.Π.Ε. Ε. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Syngenta Crop Protection
Monthey SA, Ελβετία

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME and the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lte

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:						
Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ κατ'ετή περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος λίτρα/ στρ		
Σιτάρι (μαλακό, σκληρό)	Ετήσια αγρωστώδη και ηλιετόφυλλα ζιζάνια¹	67-100	-	10-50	Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την έναρξη του σκελετώματος του σιταριού ως το σχηματισμό του 2 ^{ου} κόμβου (BBCH 21-32)	1

Παρατηρήσεις:
1. Ευαίσθητα ζιζάνια: **Άλεπονουρά**, (*Alopecurus myosuroides*), **Αγριοβρώμη** (*Avena spp*), **Φάληρη** (*Phalaris brachystachys*, *Phalaris paradoxa*), **Ήρα** (*Lolium rigidum*, *Lolium multiflorum*), **Μεγαλόκαρπη κοιλιασίδα** (*Galium aparine*), **Χαμομήλι** (*Matricaria chamomilla*), **Παπαρούνα** (*Papaver rhoeas*), **Άγριο σινάμι** (*Sinapis arvensis*).
2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων.
3. Εφαρμόστε το προϊόν σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες που είναι προσβεβλημένες ή είναι ταλαιπωρημένες από το κρύο ή την ξηρασία, γιατί η αποτελεσματικότητα μπορεί να μην είναι η βέλτιστη.
4. Η επανειλημμένη χρήση του σκευάσματος ή άλλων ζιζανιοκτόνων με τον ίδιο τρόπο δράσης, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
5. Για την μέγιστη αποτελεσματικότητα, να εφαρμόζεται το TRAXOS ONE, σε ζιζάνια που βρίσκονται σε φάση έντοννης / ενεργής ανάπτυξης. Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν είναι τα ζιζάνια σε κατάσταση στρες.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
Ειδικές συνθήκες χρήσης:
1. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την **αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας**.
2. Μην καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση των υδάτων μέσω των συστημάτων αποστράγγισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των οδικών δικτύων.
3. Μη ρυπαίνετε το αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
4. Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
5. Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα και σπόρους.
6. Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.
7. Μη διηλιεψκόζετε τα άκρα των ζωνών.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και απορής ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση εκ νέου απορής της καλλιέργειας λόγω καρκινών συνθηκών ή καταστροφής της καλλιέργειας, είναι δυνατόν να ξανασπαρθεί σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη και οραβόσπο, χωρίς να τηρηθεί κανένα διάστημα ασφαλείας.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Σιτάρι: Μην εφαρμόζοιμο
Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική φραγμένη συσκευασία του μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, με θερμοκρασία 0-35° C.





Αρ. Παρτίδας:

Βλέπε φιάλη

Ημ/νία Παραγωγής:

Βλέπε φιάλη