

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ :

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε και κατά το ψεκασμό. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες Αποθήκευσης: Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο στην αρχική απараβίαστη συσκευασία του. Σ' αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.

Αριθμός παρτίδας :

Ημερ. παραγωγής : βλέπε συσκευασία

Ημερ. λήξης :

TRIDENT

Triclopyr 48% EC
(Τρικλοπύρ 48%)

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Εγγυημένη Σύνθεση : Triclopyr (ισοδύναμο οξέος 48% β/ο και υπό μορφή Butyl glycol ester 68.83% β/ο).
Βοηθητικές Ουσίες : 35.65% β/β.

Διασυστηματικό θαμνοκτόνο για τα βάτα, πουρνάρια και πολλά άλλα ανεπιθύμητα φυτά σε ακαλλιέργητες εκτάσεις



Επιβλαβές
N



Επικίνδυνο
για το περιβάλλον

Ερεθίζει το δέρμα.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες, δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας 7554/17.12.98

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ:  CHIMAC AGRIPHAR SA, Βέλγιο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:



ΓΕΛΦΑΡΜ AEBE

ΑΘΗΝΑ: ΔΕΩΦ. ΝΑΤΟ ΘΕΣΣ ΠΗΛΑΙΧΟ, Τ.Θ. 92, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19300

ΤΗΛ: 210 5578777, FAX: 210 5578768

ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε.Θ. Σίνδος, ΤΚ : 570 22, Τηλ : 2310 795 705

ΛΑΡΙΣΑ: ΛΑΓΟΥ 6, ΤΗΛ: 2410 612477

ΚΑΘ. ΠΕΡΙΕΧ.: 1 ΛΙΤΡΟ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

(κυβ. εκατ. ανά 100 λίτρα νερό).

Ακαλλιέργητες εκτάσεις: α) Σφένδαμος (*Acer spp*), Μαυραγκαθιά (*Alnus spp*), Σημύδα (*Betula spp*), Κρασιά (*Cornus spp*), Μουμουτζελιά (*Crataegus spp*), Διόσπυρος (*Diospyros spp*), Φλαμουριά (*Fraxinus spp*), Αγριολεύκη (*Populus spp*), Αγριοκερασιά (*Prunus spp*), Πουρνάρι (*Quercus spp*), Βασιλιά (*Rosa spp*) : 250-750 κ.ε. β) Βάτο (*Rubus spp*) : 150-200 κ.ε., γ) Ιτιά (*Salix spp*), Καραγάτσι (*Ulmus alata*) και άλλα πλατύφυλλα φυτά : 250-750 κ.ε.. **Τρόπος-χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασμός όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί τελείως ώστε να κατεβαίνουν στις ρίζες αρκετοί χυμοί (στους θάμνους και στα δέντρα από τα μέσα Μαΐου μέχρι μέσα Οκτωβρίου). Λούστε καλά το φύλλωμα και τα κλαδιά μέχρι τη βάση, μέχρι πρώτης απορροής.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού : Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Διαλύστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα : Φυλάξτε το χωριστά από άλλα γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Μη μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Ψεκάστε με πίεση χαμηλότερη από 2 ατμόσφαιρες. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας. Μην το χρησιμοποιείστε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό. Καταστρέψτε τα άδεια δοχεία με πίεση ή τρύπημα. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα άδεια υλικά συσκευασίας. Όταν έχει πολύ ζέση ραντίστε αργά το απόγευμα.

Φυτοτοξικότητα : Τα τριφύλλια, τα πεύκα, τα καλλωπιστικά και οι εδώδιμες καλλιέργειες είναι ευαίσθητα στο Triclopyr.