

ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
Κρατείστε τα κοτόπουλα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 7 ημέρες.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Δεν πρέπει να σπέρνεται ή να φυτεύεται άλλη καλλιέργεια πλην του γλυκού καλαμποκιού πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή.

Χρονική σταθερότητα - Αποθήκευση:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του σε θερμοκρασίες μέχρι 35° C αποθηκευμένο στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμοί φυλλώματος ή ριζοπότισμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Αναμιγνύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού. Προσθέτουμε τη "κρέμα" μέσα σε καθαρό νερό στον ψεκαστήρα και συμπληρώνουμε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού. Ανακατεύουμε καλά το ψεκαστικό διάλυμα και εφαρμόζουμε μέσα σε λίγες ώρες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολλοκύθι (Θ), Πεπόνι (Θ), Σέλινο (Θ), Καρότο (Θ), Πιπεριά (Θ), Μπιζέλι (Θ), Φασόλι (Θ) = 7 Ημέρες

Φυτοτοξικότητα: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που συνιστάται και στις αντίστοιχες δόσεις εφαρμογής, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσεως της ετικέτας.

Συνδυαστικότητα: -----.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (βαζάκια, σακούλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό), καταστρέφονται με τρύπημα ή σκίσιμο αντίστοιχα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης και εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



Αριθμ. παρτίδας: Βλέπε φιάλη
Ημ. παραγωγής: Βλέπε φιάλη

L170618 GREC/2R



syngenta

Cyromazine 75% (συρομαζίνη)

Βρέξιμοι κόκκοι (WP)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Γεωργίας: 1588/29-06-92

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Cyromazine 75% β/β

Βοηθητικές ουσίες 21,05% β/β.

Διασυστηματικό εντομοκτόνο απορροφούμενο

από τα φύλλα και τις ρίζες.

Δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης των εντόμων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E,

Ανθούσα, ΑΤΤΙΚΗΣ, Τηλ.: 210 6666612-13

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

www.syngenta.gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Chemark Kft, Ουγγαρία

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
- Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο
- Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε** αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
- Σε περίπτωση κατάποσης** μην προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγήσετε τίποτα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Συνιστάται πλύση στομάχου.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια** πλύντε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν υπάρξει ερεθισμός του δέρματος ή των οφθαλμών ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αν εισπνευσθεί μεταφερθείτε σε καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

200 gr e

Φάσμα δράσης:
Τομάτα (θερμοκηπίου), Μελιτζάνα (θερμοκηπίου),Πεπόνι (θερμοκηπίου), Καρότο (θερμοκηπίου),Πιπεριά (θερμοκηπίου), Μπιζέλι (θερμοκηπίου), Φασόλια (θερμοκηπίου): για την αντιμετώπιση της Λιριόμυζας (Liriomyza spp.) Ψεκασμός φυλλώματος: δόση σκευάσματος 18,50-30 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρό και όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστη δόση 30 γραμ. σκευάσμ./στρέμμα. Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτική εφαρμογή ή εφαρμογή στα αρχικά στάδια. Η μεγάλη δόση σε εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιερ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Εφαρμογή στο έδαφος: δόση σκευάσματος 20-100 γραμ. σκευάσμ./στρέμμα, εφαρμογή είτε με το σύστημα ποτίσματος είτε με ριζοπότισμα φυτό-φυτό. Η δόση είναι ανάλογη με τη διάρκεια δράσης που θέλουμε να επιτύχουμε και αντιστοιχεί σε 1-3 μήνες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιερ. περίοδο: 1. Αγγούρι (θερμοκηπίου), Κολλοκύθι (θερμοκηπίου): για την αντιμετώπιση της Λιριόμυζας (Liriomyza spp.) Ψεκασμός φυλλώματος: δόση σκευάσματος 18,50-30γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρό και όγκος ψεκ. υγρού 50-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστη δόση 24 γραμ. σκευάσμ./στρέμμα. Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτική εφαρμογή ή εφαρμογή στα αρχικά στάδια. Η μεγάλη δόση σε εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιερ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Εφαρμογή στο έδαφος: δόση σκευάσματος 20-100 γραμ. σκευάσμ./στρέμμα, είτε με το σύστημα ποτίσματος είτε με ριζοπότισμα φυτό-φυτό. Η δόση είναι ανάλογη με τη διάρκεια δράσης που θέλουμε να επιτύχουμε και αντιστοιχεί σε 1-3 μήνες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιερ. περίοδο: 1. Σέλινο (θερμοκηπίου): για την αντιμετώπιση της Λιριόμυζας (Liriomyza spp.) Ψεκασμός φυλλώματος: δόση σκευάσματος 18,50-30γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό και όγκος ψεκ. υγρού 50-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστη δόση 24 γραμ. σκευάσμ./στρέμμα. Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτική εφαρμογή ή εφαρμογή στα αρχικά στάδια. Η μεγάλη δόση σε εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιερ. περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. **Ανθοκομικά (θερμοκηπίου):** για την αντιμετώπιση της Λιριόμυζας (Liriomyza spp.) Ψεκασμός φυλλώματος: δόση σκευάσματος 18,50-30 γρ. /100 λίτρα ψεκ.υγρό και όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστη δόση 30 γραμ. σκευάσμ./ στρέμμα. Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτική εφαρμογή ή εφαρμογή στα αρχικά στάδια. Η μεγάλη δόση σε εκδηλωμένη έντονη προσβολή και μέχρι την καταστολή της. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιερ. περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες, στο ψεκασμό φυλλώματος. Εφαρμογή στο έδαφος δόση σκευάσματος 18,50-130 γραμ. σκευάσμ./ στρέμμα, είτε με το σύστημα ποτίσματος είτε με ριζοπότισμα φυτό-φυτό. Η δόση είναι ανάλογη με τη διάρκεια δράσης που θέλουμε να επιτύχουμε και αντιστοιχεί σε 1-3 μήνες.