

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. • Να φοράτε κατάλληλα γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Αποφύγετε επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Εάν εμφανιστούν προβλήματα ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε την συσκευασία/ετικέτα στον γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλεφάρια ανοικτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να πείτε αβήθονο νερό. Μην προκαλείτε εμετό και μην δίνετε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής είναι αναισθητός ή έχει σπασμούς. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, απομακρυνέτέ του σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ψεκαστή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Κεράσια, Ροδακινιά, Νεκταρίνια, Βερικοκία, Δαμασκηνία, Μαρούλι (υπαίθρου): 7 ημέρες Φράουλα (θερμοκηπίου), Τομάτα (υπαίθρου, θερμοκηπίου), Πιπερία (υπαίθρου, θερμοκηπίου): 3 ημέρες
Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο (υπαίθρου): 14 ημέρες.
Σταράγγι (υπαίθρου): Μη εφαρμοσίμο (>120 ημέρες)
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΕΚΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική φραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Αρ. Παρτίδας: ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής: ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημ. Λήξης: ως άνω μέρος συσκευασίας



TRIGRAMM®

26.7/6.7 WG

boscalid (μποσκαλίντ) + pyraclostrobin (πυρακλαιοστρομπίν)
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη Σύνθεση: Boscalid 26.7% β/β (ομάδα καρβαμειδικά)
Pyraclostrobin 6.7% β/β (ομάδα μεθοξυκαρβαμειδικά)
Βοηθητικές ουσίες 65.3% β/β



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μυκητοκτόνο με προληπτική και κατά περίπτωση θεραπευτική δράση που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.**
- **Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60320/02-05-2012

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500 γρ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Α.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

© Σήμα κατατεθέν BASF

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει απολακτική και διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (συμπλόκο II) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφανείας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ – ΔΟΣΕΙΣ (γραμμ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού)

ΚΕΡΑΣΙΑ. Για μονίλια (*Monilinia laxa*) και **ιδίο** (*Sphaerotheca pannosa*) κάνετε ψεκασμούς ανά 7-10 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πτώση των πετάλων. **Δόση:** 60-75 για μονίλια και 60 για **ιδίο**. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ.** περίοδο: 3.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ. Για **μονίλια** (*Monilinia laxa*) και **ιδίο** (*Sphaerotheca pannosa*) κάνετε ψεκασμούς ανά 7-14 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πτώση των πετάλων και κατά την ανάπτυξη των καρπών. **Δόση:** 60-75 για μονίλια και 60 για **ιδίο**. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ.** περίοδο: 3.

ΦΡΑΟΥΛΑ (θερμοκηπίου). ⁽¹⁾ Για **βοτρυτή** (*Botrytis cinerea*) και **ιδίο** (*Sphaerotheca macularis*) ψεκάστε ανά 5-7 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την έναρξη της άνθησης μέχρι την ωρίμανση των καρπών. **Δόση:** 135-150 για βοτρυτή και 75-100 για **ιδίο**. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ.** περίοδο: 3.

ΚΑΡΟΤΟ (υπαίθρου). ⁽¹⁾ Για **ιδίο** (*Erysiphe heraclei*) και **αλτερνάρια** (*Alternaria dauci*) ψεκάστε ανά 10-14 ημέρες (εφόσον απαιτείται) κατά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. **Δόση:** 100 για **ιδίο** και 75 για αλτερνάρια. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80 λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ.** περίοδο: 2.

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ (θερμοκηπίου και υπαίθρου). ⁽¹⁾ Για **βοτρυτή** (*Botrytis cinerea*) και **ιδίο** (*Leveillula taurica*) ψεκάστε ανά 7-10 ημέρες (εφόσον απαιτείται) με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Η μεγαλύτερη δόση θα πρέπει να εφαρμόζεται κάτω από έντονες συνθήκες προσβολής. **Δόση:** 100-150. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ.** περίοδο: 3.

ΜΑΡΟΥΛΙ (υπαίθρου). ⁽¹⁾ Για **βοτρυτή** (*Botrytis cinerea*) και **σκληροτίνια** (*Sclerotinia sclerotiorum*) ψεκάστε ανά 7-10 ημέρες (εφόσον απαιτείται) κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης της καλλιέργειας. **Δόση:** 120-150. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ.** περίοδο: 2.

ΣΠΑΡΑΓΓΙ (υπαίθρου). Για **σκαρίαση** (*Puccinia asparagi*) κάνετε ψεκασμούς ανά 10-15 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από την έναρξη της άνθησης μέχρι τη γήρανση του υπέργειου τμήματος. **Δόση:** 75-100. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ.** περίοδο: 2.

ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ (υπαίθρου). Για **βοτρυτή** (*Botrytis cinerea*) και **περονόσπορο** (*Peronospora destructor*) ψεκάστε ανά 10-14 ημέρες (εφόσον απαιτείται) από το στάδιο της πάχυνσης της βάσης των φύλλων μέχρι την ανάπτυξη του ανθικού στελέχους. **Δόση:** 150. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ.** περίοδο: 2.

ΠΑΤΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
⁽¹⁾ Όταν είναι παρόντα και τα δύο παθογόνα, συνιστάται η μεγαλύτερη δόση.

- Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Εφαρμόστε το TRIGRAMM 26.7/6.7 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και περιορίστε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
Εφαρμόστε το TRIGRAMM 26.7/6.7 WG σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3.