

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ: Περονόσπορος. Δόση: **260 γρ./100 λίτρα νερό**. Εφαρμογές: α) Όταν οι βήαστοι έχουν μήκος 10 εκ., β) Πριν την άνθηση, γ) Μετά τη γονιμοποίηση. **ΠΑΤΑΤΑ:** Δόση: **250 γρ./100 λίτρα νερό**. Περονόσπορος. Εφαρμογές από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες. Αθηρναρίωση, Ανθράκνωση. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ:** Σκωρίαση. Δόση: **250 γρ./100 λίτρα νερό**. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** Κερκοσπορίωση. Δόση: **260 γρ./100 λίτρα νερό**. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΚΑΠΝΟΣ:** Περονόσπορος. Δόση: **250 γρ./100 λίτρα νερό**. Στο σπορείο μία εβδομάδα μετά το σταύρωμα των φυτών και στο χωράφι μέχρι ένα μήνα μετά τη μεταφύτευση. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ-ΓΑΡΥΦΑΛΙΕΣ:** Σκωρίαση. Δόση: **320 γρ./100 λίτρα νερό**. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Πατάτα (7), Ζαχαρότευτλα (5), Αμπέλι-Καπνός (4), Κρεμμύδι (Ξερό) (3).

Όγκος ψεκαστικού υγρού/καλλιέργεια (λίτρα/στρέμμα):

Αμπέλι (150), Κρεμμύδι Ξερό (50), Πατάτα-Καπνός-Τριανταφυλλιά-Γαρυφαλιά (100), Ζαχαρότευτλα (40).

Παρατηρήσεις:

1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 2) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δεητίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι, Κρεμμύδι, Ζαχαρότευτλα: **28 ημέρες**.

Πατάτα: **14 ημέρες**.

Καπνός: **30 ημέρες** από τη μεταφύτευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις και κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Επειδή μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες καλληποιστικών, να γίνεται δοκιμή πριν γενικευτεί η εφαρμογή του. Δε συνιστάται για εφαρμογές σε φυτά σπορείου.

ΤΡΙΜΑΝΓΚΟΛ 75:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί φυλλώματος μεγάλου όγκου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Στη συνέχεια προσθέστε τη συνιστώμενη δοσολογία και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δε συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν μη εξουδετερωμένο βορδιγάλαιο πολτό, etherphon και γαλακτωματοποιησιμους πολτούς ορυκτελαίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟ-ΣΤΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι σακούλες και τα σακίδια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος δροσερό, προφυλαγμένο από υγρασία και μακριά από φωτιά και σπίθες. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

Trimangol®

75WG

Maneb (Μανέμπι) 75%
Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Maneb** 75% β/β
Βοηθητικές ουσίες 12,8% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 6573/28.4.93
Ημ/νία Λήξης: 30.06.2010

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ



Κάτοχος της έγκρισης:
Cerexagri S.A. - Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα. •Προστατεύστε τη συσκευασία από την υγρασία. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. •Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. •Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθυστα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. •Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης, προκαλέστε εμετό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΚΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ 21 ΗΜΕΡΕΣ

02/2008-9



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ