

TRIMANOC 72WP BLUE:
Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαθέτει δε ευρύ φάσμα δράσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά): Φουζικλάδιο. Δόση: **160-220 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλων και 7-10 ημέρες αργότερα. **ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο):** Δόση: **220 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Περονόσπορος. Εφαρμογές όταν οι βήαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Φόμοψη, Μαύρη σήψη. 1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1^{ου} φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Ξηρό):** Περονόσπορος. Δόση: **220-270 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου):** Δόση: **220 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Περονόσπορος. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων. Σεπτόρια, Αλτερναρίωση. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίθρου):** Αλτερναρίωση. Δόση: **220 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΚΑΡΟΤΟ:** Αλτερνάρια. Δόση: **220 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Πεπόνι-Καρπούζι-Κολλοκύθι) (υπαίθρου):** Κηλαδοσπορίωση. Δόση: **220 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΜΑΡΟΥΛΙ (υπαίθρου):** Περονόσπορος. Δόση: **220 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΠΑΤΑΤΑ:** Περονόσπορος, Αλτερναρίωση. Δόση: **220 γρ./στρ.** Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.

Όγκος ψεκαστικού υγρού/καλλιέργεια (λίτρα/στρέμμα):
Μηλοειδή (μηλιά-αχλαδιά)-Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)-Τομάτα (υπαίθρου)-Μελιτζάνα-Πιπεριά (υπαίθρου)-Καρότο-Κολοκυνθοειδή (πεπόνι-καρπούζι-κολλοκύθι) (υπαίθρου)-Πατάτα (50-100), Μαρούλι (Υπαίθρου) (60-100), Κρεμμύδι (Ξηρό) (40-100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο), Κρεμμύδι (Ξηρό), Τομάτα (υπαίθρου), Μελιτζάνα-Πιπεριά (υπαίθρου), Κολοκυνθοειδή (πεπόνι-καρπούζι-κολλοκύθι) (υπαίθρου): Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. Μαρούλι (υπαίθρου): Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. Μηλοειδή (μηλιά-αχλαδιά): Μέχρι 4 εφαρμογές εφόσον απαιτείται. Καρότο: Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα. Πατάτα: Μέχρι 8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:
**1) Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπε-
λόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του Trimanoc®
72WP. 2)** Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συν-
θήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **3)** Το
εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της
προσβολής. **4)** Στις περιοχές, όπου εφαρμόζονται
τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, να
ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προ-
ειδοποιήσεων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Το Trimanoc® 72WP πρέπει να χρησιμοποιείται,
προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτι-
κότητας σε μυκητοκτόνα, με εξειδικευμένο τρόπο
δράσης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Μηλιά-Αχλαδιά-Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιή-
σιμο), Κρεμμύδι, Μαρούλι (υπαίθρου): **28 ημέρες.**
Καρότο: **35 ημέρες.**
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπόνι, Καρπούζι,
Κολλοκύθι (υπαίθρου): **3 ημέρες.**
Πατάτα: **7 ημέρες.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Μπορεί να προκαλέσει σκωριόχρωση σε μηλιές
Golden Delicious. Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες
της αχλαδιάς Βουτυράτα, Κόσια και Κρυστάλλι.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακ-
κούλεις, σακκίδια μαζί με τα κουτιά), αφού κατα-
στραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη δια-
σφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται
όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανά-
κτηση ενέργειας.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ -
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗ-
ΞΗΣ:** Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική του,
κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλή αεριζό-
μενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες
θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές
τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια του-
λάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας.

**Trimanoc®
72WP blue**

**Mancozeb (Μανκοζέμπ) 72%
Βρέξιμη σκόνη**

Εγγυημένη σύνθεση: **Mancozeb 72% β/β**
Βοηθητικές ουσίες: 15,3% β/β
Α.Α.Δ.Α.: 60299/06.09.2010

**Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση
κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



Κάτοχος της άδειας:
Cerexagri S.A.S. - Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας-Υπεύθυνος για τη διάθεση του
προϊόντος στην αγορά-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσσ/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
• Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
• Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα •Φοράτε κατάλληλη
προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Φοράτε κατάλληλη
αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλ-
ληλες μπότες κατά την εφαρμογή. •Οι εργάτες θα πρέπει να
φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν
εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε
αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετι-
κέτα. **Γενικά,** μην χορηγείτε υγρά και μην προκαλείται εμετό
εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει
σπασμούς. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε τα
εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνε-
τε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και
σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε
περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε τα μάτια με καθα-
ρό νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής
μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξεπλύμα για αρκετά λε-
πτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευθείτε
οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση εισπνοής,** μεταφέρετε τον πα-
θόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό. **Για το γι-
ατρό,** φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινό-
πνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει
δράση δισουλφιδράμης. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδο-
το. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**



07/2013-4

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ