

ΤΡΙΜΑΝΟΚ 75WG:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαθέτει δε ευρύ φάσμα δράσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά-Αχλαδιά): Φουζικηάδιο. Δόση: **210 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης κορυφής, ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλιων και 7-10 ημέρες αργότερα. **ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο):** Δόση: **210 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Περονόσπορος. Εφαρμογές όταν οι βίλαστοι έχουν μήκος περίπου 10 εκ. και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Φόμωση, Μαύρη σήψη. 1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1^{ου} φύλληλου, στο στάδιο των 2-3 φύλληλου. **ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Ξηρό):** Περονόσπορος. Δόση: **210-260 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου):** Δόση: **210 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Περονόσπορος. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων. Σεπτόρια, Αλτερναρίωση. Εφαρμογές με την εμφανιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίθρου):** Αλτερναρίωση. Δόση: **210 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΚΑΡΟΤΟ:** Αλτερνάρια. Δόση: **210 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Πεπόνι-Καρπούζι-Κοηοκύθι) (υπαίθρου):** Κηοδοσπορίωση. Δόση: **210 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΜΑΡΟΥΛΙ (υπαίθρου):** Περονόσπορος. Δόση: **210 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.** Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΠΑΤΑΤΑ:** Περονόσπορος, Αλτερναρίωση. Δόση: **210 γρ./στρ.** Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.

Όγκος ψεκαστικού υγρού/καλλιέργεια (λίτρα/στρέμμα):

Μαρούλι (υπαίθρου) (60-100), Μηλιά-Αχλαδιά-Αμπέλι (επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο)-Τομάτα (υπαίθρου)-Μελιτζάνα-Πιπεριά (υπαίθρου)-Καρότο-Πεπόνι-Καρπούζι-Κοηοκύθι (υπαίθρου)-Πατάτα (50-100), Κρεμμύδι (ξηρό) (40-100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Καρότο: Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα. Αμπέλι (επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο)-Κρεμμύδι (ξηρό)-Τομάτα (υπαίθρου)-Μελιτζάνα-Πιπεριά (υπαίθρου)-Πεπόνι-Καρπούζι- Κοηοκύθι υπαίθρου): Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. Μαρούλι (υπαίθρου): Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται. Μηλιά-Αχλαδιά: Μέχρι 4 εφαρμογές εφόσον απαιτείται. Πατάτα: Μέχρι 8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:

- 1) Να μη χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του Trimanoc® 75WG.
- 2) Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
- 3) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
- 4) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το Trimanoc® 75WG πρέπει να χρησιμοποιείται, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα, με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Καρότο: **35 ημέρες.** Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι (επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο), Κρεμμύδι, Μαρούλι (υπαίθρου): **28 ημέρες.** Πατάτα: **7 ημέρες.** Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπόνι, Καπούζι, Κοηοκύθι (υπαίθρου): **3 ημέρες.**

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Μπορεί να προκαλέσει σκωριόχρωση σε μηλιές Golden Delicious. Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες της αχλαδιάς Βουτυράτα, Κόσια και Κρυστάλλι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακκούλες, σακκίδια μαζί με τα κουτιά), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο, προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

Trimanoc® 75WG

Mancozeb (Μανκοζέμπ) 75% Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Mancozeb 75% β/β (750 g/kg)**
Βοηθητικές ουσίες 11,76% β/β
Αρ.Έγκρ.Κυκλ.φ.: 60295/06.09.2010

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της έγκρισης:

Cerexagri S.A.S. - Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση του προϊόντος στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Μέλος του



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

•Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. •Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα •Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. •Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή. •Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Γενικά,** μην χορηγείτε υγρό και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση εισπνοής,** μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό. **Για το γιατρό:** Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόφυμα θα πρέπει να αποφεύγεται, γιατί το mancozeb έχει δράση διουρητική. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777**

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

09/2013-4



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑΝ ΑΦΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **5 ΜΕΤΡΩΝ** ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ, **10 ΜΕΤΡΩΝ** ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ **30 ΜΕΤΡΩΝ** ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΕΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΜΠΙΝΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 500 γρ.