

Trimanoc® 80WP

Mancozeb (Μανκοζέμπ) 80%
Βρέξιμη σκόνη

Εγγυημένη σύνθεση: **Mancozeb 80% β/β**

Βοηθητικές ουσίες 5,9% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Φ.: 60296/06.09.2010

Ημ/νία Λήξης Έγκρισης: 30.06.2016

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών

TRIMANOC 80 WP:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαθέτει δε ευρύ φάσμα δράσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο): Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Περονόσπορος. Εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Φόμοψη, Μάυρη σήψη. 1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1^{ου} φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων.
ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Ξηρό): Περονόσπορος. Δόση: 200-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου):** Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Περονόσπορος. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων. Σεπτόρια, Αίτηρναρίωση. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου):** Περονόσπορος, Αίτηρναρίωση. Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Πεπόνι-Καρπούζι) (υπαίθρου):** Κηλδοσπορίωση. Δόση: 200 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. **ΠΑΤΑΤΑ:** Περονόσπορος, Αίτηρναρίωση. Δόση: 200 γρ./στρ. Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.

Όγκος ψεκαστικού υγρού/καλλιέργεια (λίτρα/στρέμμα):

Αμπέλι (επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο)-Τομάτα (υπαίθρου)-Μελιτζάνα (υπαίθρου)-Κολοκυνθοειδή (πεπόνι-καρπούζι) (υπαίθρου)-Πατάτα (50-100), Κρεμμύδι (Ξηρό) (40-100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Αμπέλι (επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο)-Κρεμμύδι (Ξηρό)-Τομάτα (υπαίθρου)-Μελιτζάνα (υπαίθρου)-Κολοκυνθοειδή (πεπόνι, καρπούζι) (υπαίθρου): Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. Πατάτα: Μέχρι 8 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:

1) Να μη χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα, σε περίπτωση χρήσης του Trimanoc® 80WP. 2) Προληπτικές εφαρμογές, εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. 3) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής. 4) Στις περιοχές, όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το Trimanoc® 80WP πρέπει να χρησιμοποιείται, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα, με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι (επιτραπέζιο και οиноποιήσιμο), Κρεμμύδι: 28 ημέρες.
Τομάτα (υπαίθρου), Μελιτζάνα (υπαίθρου), Πεπόνι (υπαίθρου), Καρπούζι (υπαίθρου): 3 ημέρες.
Πατάτα: 7 ημέρες.

Κάτοχος της έγκρισης:
Cerexagri S.A.S. - Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας-Υπεύθυνος για την τεχνική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες**

**ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ**

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Γενικά,** μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξεπλύμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση εισπνοής,** μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό. **Για το γιατρό,** φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση διουρητική. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777**

**ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΦΕΡΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΔΕΛΤΙΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑΝ ΑΨΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5
ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΚΑΙ 10
ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακκούλες, σακκίδια μαζί με τα κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:**

Αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 6 κιλά



02/2010-9