

50 WG
TELDOR®



TEΛΝΤΟΡ
50 WG

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Μη δισυστηματικό μυκητοκτόνο με εκλεκτική προληπτική δράση στο βοτρυτίη. Δεν παρεμποδίζει τη βλάστηση των σποριών αλλά την ανάπτυξη των βλαστικών υφών των μυκήτων και τη διεύθυνσή τους στο εσωτερικό του φυτού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού και η πίεση πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να γίνει διαβροχή του φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστάμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΣΤΟΧΟΣ- ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)

Βοτρυτίης (*Botrytis cinerea*): Εφαρμογές στην άνθηση, λίγο πριν το κλείσιμο του βότρυ μέχρι την ωρίμανση. **Δόση:** 100-150 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (100-150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

ΦΡΑΟΥΛΑ (υπαίθρου και θερμοκηπίου)

Βοτρυτίης (*Botrytis cinerea*): Εφαρμογές κυρίως στην άνθηση και μέχρι την ωρίμανση. **Δόση:** 150 γρ. σκευάσματος/στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-70 λίτρα/στρέμμα.

ΤΟΜΑΤΑ (θερμοκηπίου)

Βοτρυτίης (*Botrytis cinerea*): Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Δόση:** 150 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

ΠΙΠΕΡΙΑ (θερμοκηπίου)

Βοτρυτίης (*Botrytis cinerea*): Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Δόση:** 150 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

ΑΓΓΟΥΡΙ (θερμοκηπίου)

Βοτρυτίης (*Botrytis cinerea*): Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Δόση:** 150 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

Διανομές:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100



Bayer CropScience

ΚΟΛΟΚΥΘΙ (θερμοκηπίου)

Βοτρυτίης (*Botrytis cinerea*): Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. **Δόση:** 150 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

ΚΑΡΠΟΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ (μόνο μετασυλλεκτική εφαρμογή)

Βοτρυτίης (*Botrytis cinerea*): Εμβάπτιση καρπών μετά τη συγκομιδή. **Δόση:** 100 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού

Παρατηρήσεις:

1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος σε σταφύλια που προορίζονται για σταφίδα.
2. Το διάλυμα εμβάπτισης που παραμένει μετά το τέλος της κατεργασίας θα πρέπει να αραιώνεται με δεκαπλάσια ποσότητα νερού και να απελευθερώνεται σε γυμνό έδαφος το οποίο:
α) Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από υδάτινη επιφάνεια και
β) Υπάρχει αδιαπέραστο στρώμα εδάφους ή χαμηλός υδροφόρος ορίζοντας (>2 μέτρα βάθος).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται. Φράουλα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Τομάτα (θερμοκηπίου): Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. Πιπεριά (θερμοκηπίου): Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. Αγγούρι (θερμοκηπίου): Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. Κολοκύθι (θερμοκηπίου): Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται. Καρποί ακτινιδιάς (μόνο μετασυλλεκτική εφαρμογή): 1. **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ**
Αμπέλι (επιτραπέζια): 7 ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμα): 14 ημέρες



TEΛΝΤΟΡ
50 WG

Φράουλα (υπαίθρου και θερμοκηπίου), Τομάτα (θερμοκηπίου), Πιπεριά (θερμοκηπίου), Αγγούρι (θερμοκηπίου), Κολοκύθι (θερμοκηπίου): 1 ημέρα
Καρποί ακτινιδιάς (μόνο μετασυλλεκτική εφαρμογή): 60 ημέρες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΎΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Εφαρμόστε το Teldor 50 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
- Εφαρμόστε το Teldor 50 WG σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα υδροξυανιλίδια με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 1-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με σκίασμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος, πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης.



5 200309 893760



TELDOR®
50 WG

Καθ. βάρος 1,5 κιλό

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
6772 / 1-4-2003

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγ. Σύνθεση: fenhexamid 50% β/β

Βοηθ. ουσίες: 47,9% β/β



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.



Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την
τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE



TELDOR®
50 WG

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.
- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση ατυχήματος μετακινήστε τον ασθενή μακριά από την επικίνδυνη ζώνη και μεταφέρετέ τον σε σταθερή πλάγια θέση.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του αμπελιού και της φράουλας και 10 μέτρων για τις καλλιέργειες της τομάτας, του αγγουριού και του κολοκυθιού.

GR80256930B