

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Κρεμμύδι (ξερό), Σκόρδο: 7 ημέρες,
Πράσο, Φρέσκα κρεμμυδάκια: 14 ημέρες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην επίσταση.

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επίστασή του. Φοράτε κατάλληλες μπότες. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατό). Τοποθετείστε τον παθόντα που έχει χάσει τις αισθήσεις του σε σταθερή (ηλιόγια) θέση και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Σε περίπτωση εμετού αποφύγετε την εισρόφιση υγρού στους πνεύμονες διατηρώντας τις αναπνευστικές διόδους ανοικτές. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατείστε τον σε ηρεμία. Σε περίπτωση αναπνευστικού προβλήματος χορηγήστε οξυγόνο. Εάν τα συμπτώματα διαρκούν καλέστε γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93777.**

ΠΟΛΥΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήνετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τα ψαρά ή τη ψαριά, να αφήνετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη.



Bayer CropScience

Διανομέας:
Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000 - Fax: 210 6109100



Totril®
22,5 EC

500 κ. εκ. e

Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: ixoθυλή 22.5% β/ο
(υπό μορφή οκτανοϊκού εστέρα 30,2% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 69% β/β

Μεταφωτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με περιορισμένη διασπομική κίνηση για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσεως

• Εύλεκτο • Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. • Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα. • Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. • Ήπιος κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. • Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. • Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει εφρότητα δερματικής αόκμοι. • Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπηληλικά ζάλη.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της έγκρισης: Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ABEE

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
7923 / 24-06-09

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τοτρίλ 22,5 EC

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μεταφωτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με περιορισμένη διασπομική κίνηση για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. Η ζιζανιοκτονία δράση του οφείλεται στην παρεμπόδιση της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός με καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των ζιζανίων με 80-100 λίτρα νερό στο στρέμμα. Συναίσταται ψεκασμός με χαμηλή πίεση 1kg/cm² και συνεχή ανάνεση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Κρεμμύδι (ξερό), Φρέσκα κρεμμυδάκια, Σκόρδο, Πράσο:
ΣΤΟΧΟΣ: Πλατύφυλλα ζιζάνια*:

α. Για την καλλιέργεια: Μετά την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου. Δόση: 150 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **β. Για την καλλιέργεια:** Μετά την εμφάνιση του 3ου πραγματικού φύλλου. Δόση: 200 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα. **γ. Για την καλλιέργεια:** Μετά την εμφάνιση του 4ου πραγματικού φύλλου. Δόση: 250 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Κρεμμύδι (ξερό), Σκόρδο, Πράσο, Φρέσκα κρεμμυδάκια: 1

***Καταπολεμώμενα ζιζάνια:**

Ευαίσθητα ζιζάνια: Ανάγallis (Anagallis arvensis), Ανθεμίδα (Anthemis spp.), Καμέλλα (Capsella bursa-pastoris), Κοιλοβούδι (Chenopodium album), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Κολνητάδα μεγαλόχορτη (Galium aparine), Πορφυρό λάμιο (Lamium amplexicaule), Πολυκόμμη (Polygonum aviculare), Αγριοπερίδα (Polygonum persicaria), Μαρτάκος (Senecio vulgaris), Ήμερο ονόπλη (Sinaris alba), Ζυχαί (Sonchus spp.), Μικρή τουσκινίδα (Urtica urens), Βερνίκια (Veronica spp.).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Στύμφνος (Solanum nigrum), Στελλάρια (Stellaria media), Αγριοπανός (Viola spp.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται έως το στάδιο α) του 2ου πραγματικού φύλλου για τη δόση των 150 κ.εκ./στρέμμα. β) του 4ου πραγματικού φύλλου για τη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα. γ) του 6ου πραγματικού φύλλου για τη δόση των 250 κ.εκ./στρέμμα. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΤΥΠΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ**

• Μην ψεκάζετε καλλιέργειες που έχουν καταπονηθεί από αντίξοες συνθήκες όπως παγωνιά, υπερβολική υγρασία, ξηρασία, ισχυρό άνεμο, μυκητολογικές ή εντομολογικές προσβολές.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/3 με καθαρό νερό και προσθέτουμε αναδεύοντας την αντιστοιχούμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς μέχρι να γίνει ομοιογενές το διάλυμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατ'αλληλο μηχανισμό ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίπλο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποδοτίζονται σε σημείο αλληλογής για ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψομεινούς που έχουν κατ'αλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.