

Triona[®] 96 EC

Θερινός πολτός

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Paraffin oil 96% β/β (CAS No. 64742-46-7),
Βοηθητικές ουσίες 4% β/β

**Θερινός Πολτός, για την καταπολέμηση κοκκοειδών,
ακάρων, αφίδων και λεπιδόπτερων.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 14295 / 18.8.2008

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 10 λίτρα

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή,
τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

® Σήμα κατατεθέν BASF

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Triona® 96 EC

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. • Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα στα οποία έπεσε σκέυασμα ή ψεκαστικό υγρό. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών-προσώπου. • Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβάλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακλόνητα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

• Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας τους.

«Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Επιπλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα: Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μικρό τύπο σκούπα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ (λίτρα σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού): **ΓΙΑΜΠΕΛΙ – ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ:** Χειμερινά αυγά του Κόκκινου Τετράνυχου (Panonychus ulmi). Συνιστάται ένας ψεκασμός τέσσερις Χειμώνα με αρχές Άνοιξης, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα και πριν την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών. **Γράση 1 λίτρο. Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50 λίτρα/στρέμμα. **2. ΕΣΤΕΡΙΑΟΕΙΔΗ (Γκρέπ φρούτ, Λεμονί, Μανταρινί, Πορτοκαλιά, Φράπ):** Κόκκινη Ψώρα (Aonidiella auranti), Ψευδόκοκκος (*Pseudococcus citri*), Λεκάδιο (*Saissetia oleae*), Ασπιδη Ψώρα (*Aspidiotus nerii*), Μαύρη Ψώρα (*Parlatoria zizyphi*), άλλα Κοκκοειδή (*Chrysomphalus dictyospermi*, *Pericarya purchasi*, *Ceroplastes rusci*, *C. sinensis*, *Mytillococcus beckii*, *Coccus hesperidum*), Τετράνυχος (*Tetranychus citri*, *Tetranychus urticae*, *Eriophyes sheldoni*, *Aculus pelecassi*), Αλευρώδεις (*Dialeurodes citri*, *Aleurorhynchus floscosus*).

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά): Ψώρα Ξαν-Ζοζέ (*Quadraspidiotus perniciosus*), Παρλατόρια (*Parlatoria oleae*), Βαμβοκάδα (*Pseudalacaspis pentagona*), Μυτιλομόρφη Ψώρα (*Lepidosaphes ulmi*), Σταχτιά Ψώρα (*Epidiaspis leperii*), Φυλλοδέστες (*Archis rosanus*, *A. podanus*), Τετράνυχος (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*, *Bryobia rubriculcis*), Ψύλλα (*Psylla spp.*), Αφίδες (*Eriosoma lanigerum*, *Aphis pomi*, *Dysaphis piri*, *D. plantaginea*).

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδάκινια, Νεκταρινί, Δαμασκηνί): Ψώρα Ξαν-Ζοζέ (*Quadraspidiotus perniciosus*), Βαμβοκάδα (*Pseudalacaspis pentagona*), Σφαίρολεκάνιο (*Sphaerolecanium pruinastrum*), Παρλατόρια (*Parlatoria oleae*), Μυτιλομόρφη Ψώρα (*Lepidosaphes ulmi*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis spp.*), Φυλλοδέστες (*Archis rosanus*, *A. podanus*), Ακάρια (*Tetranychus urticae*, *Bryobia praetiosa*, *Aculus spp.*), Προνύμφες Αφίδων και άλλων εντόμων.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Ψώρα Ξαν-Ζοζέ (*Quadraspidiotus perniciosus*), Βαμβοκάδα (*Pseudalacaspis pentagona*), Σφαίρολεκάνιο (*Sphaerolecanium pruinastrum*), Παρλατόρια (*Parlatoria oleae*), Μυτιλομόρφη Ψώρα (*Lepidosaphes ulmi*), Αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis spp.*), Φυλλοδέστες (*Archis rosanus*, *A. podanus*), Ακάρια (*Tetranychus urticae*, *Bryobia praetiosa*, *Aculus spp.*), Προνύμφες Αφίδων και άλλων εντόμων.

ΕΛΙΑ: Λεκάδιο (*Saissetia oleae*), Ασπιδιώτης (*Aspidiotus nerii*), Παρλατόρια (*Parlatoria oleae*), Πολίνια (*Pollinia pollini*), Μυτιλομόρφη Ψώρα (*Lepidosaphes ulmi*), Βαμβοκάδα (*Euphyllura olivina*), Προνύμφες εντόμων. **ΚΑΛΑΜΠΟΤΙΣΤΙΚΑ:** Κοκκοειδή (*Parlatoria spp.*, *Aspidiotus spp.*, *Diaspis spp.*, *Saissetia oleae*, *Icerya purchasi*, *Ceroplastes sinensis*, *Pseudococcus spp.*), Φυλλορύκτες (*Napitculia centifoliella*, *Hyponomeuta malinellus*, *Leucoptera spp.*), Φυλλοδέστες (*Tortrix spp.*), Αφίδες (*Aphis spp.*).

Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστάται ψεκασμοί Άνοιξης (με την έναρξη της βλάστησης), Καλοκαίριου, Φθινοπώρου, Χειμώνα.

Για τα εσπεριδοειδή, η καλύτερη εποχή είναι αρχές Ιουνίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονων προβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και τον χειμώνα (Φεβρουάριο-Μάρτιο).

Δόση: 1-1,3 λίτρα ή 0,5 λίτρο σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου.

ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (λίτρα/στρέμμα):

Εσπεριδοειδή: 200-400, Μηλοειδή – Πυρηνόκαρπα: 150-250, Αμυγδαλιά: 100-200, Ελιά: 150-300, Καλλωπιστικά: 80.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Αμπέλι – Ακτινιδία: 1. Λοιπές καλλιέργειες: 4.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προβολής.

2. Κατά τη χρήση του σκευάσματος τα δέντρα πρέπει να είναι ποτιζόμενα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν τον ψεκασμό.

3. Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας.

4. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.

5. Να μην γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.

6. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θειού ή θειασουλφίου.

7. Στα μηλοειδή και ειδικά στο Κρυστάλλι να μην προηγηθεί η ένεση εφαρμογής captan, folpet, διπλородονόσμων σε διάστημα τουλάχιστον μιας (1) εβδομάδας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑ:

Αμπέλι, Ακτινιδία: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΞΙΜΟ (λόγω του χρόνου εφαρμογής).

Λοιπές καλλιέργειες: 21 ημέρες. Σε περίπτωση αναμειγνύμενο με άλλο σκεύασμα σφειλόμε με να τηρούμε την «τελευταία επέμβαση» του άλλου σκευάσματος (εάν αυτή είναι πάντα από 21 ημέρες).

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, captan, captan.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (πχ σε μερικά καλλωπιστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευσή μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδεύεται καλά. Σε περίπτωση που το αναμειγνύμενο με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: --

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΞΥΡΣΗ ΤΩ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται από πίσω με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπια για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποστρέψουν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του παραβολή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

