

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Η είσοδος του εργάτη στον αγρό να γίνεται αφού στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό πάνω στις ψεκασμένες επιφάνειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυση (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



CET/CVAC-1L - 09/10
06/2013-2



GOËMAR

Κάτοχος της έγκρισης:
Laboratoires Goëmar S.A.,
Saint Malo - Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά-Διανομέας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΡΙΓΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Θεσο/νίκης: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωάνια

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Vacciplant® SL


Laminarin (Λαμιναρίν) 4,5%
Πυκνό διάλυμα

Εγγυημένη σύνθεση: **Laminarin 4,5% β/ο**
Βοηθητικές ουσίες: 94,9% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλόφ.: 11105/30.07.2009

**Ενεργοποιητής των μηχανισμών
άμυνας των φυτών
χωρίς να είναι μυκητοκτόνο ή βακτηριοκτόνο**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες



ΒΑΣΙΠΛΑΝΤ:

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν **Vacciplant®** δρα ως ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών, χωρίς να είναι μυκητοκτόνο ή βακτηριοκτόνο. Δρα ενισχύοντας την αντίσταση του φυτού ενάντια στο βακτηριακό κάψιμο, το ωίδιο, τον βοτρυτή, το φουζικλάδιο και τον περονόσπορο, μειώνοντας έτσι τις βλαβερές επιπτώσεις τους στις καλλιέργειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος αναδεύοντας. Συντηρώστε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Εφαρμόστε το αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ: Βακτηριακό κάψιμο. Δόση: **75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό.** Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την πτώση των πετάλων και επανάληψη κάθε 10 ημέρες. Σε περίπτωση όψιμων μολύνσεων, μετά την άνθηση, μπορεί να γίνουν περαιτέρω ψεκασμοί. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. **ΜΗΛΙΑ:** Φουζικλάδιο. Δόση: **100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό.** Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι το καρπώδιο. Σε περίπτωση όψιμων μολύνσεων, μπορεί να γίνουν περαιτέρω ψεκασμοί μέχρι τη συγκομιδή. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. **ΑΜΠΕΛΙ:** Ωίδιο. Δόση: **150-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό.** Προληπτικοί ψεκασμοί από την έναρξη της βλάστησης μέχρι την ωρίμανση. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. **ΦΡΑΟΥΛΙΑ (υπαίθρου & θερμοκηπίου):** Ωίδιο. Δόση: **75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό.** Προληπτικοί ψεκασμοί από την αρχή της βλάστησης και επανάληψη κάθε 10 ημέρες. **ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου & θερμοκηπίου):** Ωίδιο. Δόση: **100 κ.εκ./στρ.** Βακτηριακή σπυγγώωση. Δόση: **100-200 κ.εκ./στρ.** Τεφρά σήψη. Δόση: **150-200 κ.εκ./στρ.** Προληπτικοί ψεκασμοί από την έναρξη της βλάστησης. **ΜΑΡΟΥΛΙ (υπαίθρου & θερμοκηπίου):** Περονόσπορος. Δόση: **120-250 κ.εκ./στρ.** Προληπτικοί ψεκασμοί από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά (100), Αμπέλι (75-100), Φράουλα-Τομάτα υπαίθρου-Μαρούλι (50-100), Τομάτα θερμοκηπίου (50-130).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος/μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά για βακτηριακό κάψιμο (7 / 10 ημέρες), Μηλιά για φουζικλάδιο (20 / 7 ημέρες), Αμπέλι (10 / 10 ημέρες), Φράουλα (7 / 10 ημέρες), Τομάτα-Μαρούλι (7 / 7-10 ημέρες).

Παρατηρήσεις:

Το **Vacciplant®** εφαρμόζεται προληπτικά και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Εάν εμφανισθούν συμπτώματα των ασθενειών ή αναμένονται ισχυρές προσβολές, ψεκάστε με κατάλληλο μυκητοκτόνο. Είναι σημαντικό να διατηρείται η συγκέντρωση του σκευάσματος στο συνιστώμενο εύρος.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα, όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής, στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα προϊόντα.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μέλος του

