



Benthiavalicarb (Μπενθιαβαθικάρμυ) 1,75%  
Mancozeb (Μακνκοζέμυ) 70%  
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

ΒΑΛΜΠΟΝ:

Μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση κατά του περonosπόρου σε αμπέλι, τομάτα, πατάτα και καπνό. Το benthiavalicarb-isopropyl (ομάδα καρβαμιδικού εστέρες) είναι διεισδυτικό/διε-  
λησματικό ωομυκητοκτόνο, με αποπληστική κίνηση. Το mancozeb (ομάδα διθειοκαρβαμιδικών) είναι μη εκλεκτικό προστατευτικό μυκητοκτόνο, με δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε προοδευτικά την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε στην συνέχεια το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Περονόσπορος.

ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμα & επιτραπέζια): Δόση: 200 γρ./στρ. Ψεκασμός όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μόλυνση και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες. ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου & θερμοκηπίου): Δόση: 200 γρ./στρ. Ψεκασμός όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μόλυνση και επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. ΠΑΤΑΤΑ: Δόση: 160 γρ./στρ. Ψεκασμός όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μόλυνση και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες. ΚΑΠΝΟΣ: Δόση: 200 γρ./στρ. Ψεκασμός όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για μόλυνση και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Αμπέλι-Τομάτα υπαίθρου-Πατάτα-Καπνός (50-100), Τομάτα θερμοκηπίου (50-130).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: Τρεις (3).

Παρατηρήσεις:

•Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εμφανίζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πίεσης προσβολής. •Σε τομάτα θερμοκηπίου ο μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με τη μικρότερη δόση (150 γρ./100 λίτρα νερό).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

•Χρήση του Valbon® προληπτικά και κατά πρότμηση στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. Μέγιστος χρόνος εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 3 και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων, που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τους καρβαμιδικούς εστέρες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι: 28 ημέρες.  
Τομάτα υπαίθρου-Πατάτα: 7 ημέρες.  
Τομάτα θερμοκηπίου: 3 ημέρες.  
Καπνός: 30 ημέρες μετά την μεταφύτευση.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Μη σπέρνετε ή φυτεύετε επόμενη καλλιέργεια αν δεν περάσουν 3 μήνες από την τελευταία εφαρμογή του Valbon®.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν παρουσιάζει καμμία φυτοτοξικότητα όταν χρησι-  
μοποιείται στις συνιστώμενες καλλιεργείες, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής, στις ελληνικές εδαφοκλίματολογικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι σακούλες και τα σακίδια ξεπλένονται υπό πίεση με τον κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλη σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜΕΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε επί της συσκευασίας.



Benthiavalicarb (Μπενθιαβαθικάρμυ) 1,75%  
Mancozeb (Μακνκοζέμυ) 70%  
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση: **Benthiavalicarb** 1,75% β/β (υπό μορφή benthiavalicarb-isopropyl)  
**Mancozeb** 70% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 15,7% β/β

Αρ.Έγκρ.Κυκλ.οφ.: 60.219/23.10.2008  
Ημερ. Λήξης: 31.07.2018

Μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση κατά του περonosπόρου

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνον για επαγγελματίες χρήστες.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΥΠΟΠΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ



Κάτοχος της έγκρισης-Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση-Διανομέας:  
**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 2111205570, Φαξ: 2111205559  
Θεσσα/νίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία  
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453  
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



Ν



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

01/2010-2



ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΨΕΚΑΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 800 γρ.