

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καννίζετε. • Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν βερωθεί. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προώπου. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάθαρτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καννίζετε και μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κάντε τεχνητή αναπνοή σε περίπτωση που δεν αναπνέει. Καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Δώστε 2 ποτήρια νερό. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Αποφύγετε τη διάθεση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του

Για να αποφευχθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ζελητώνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλή ελπίση (τα νερά του ελπίματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναπομένει να σημειά ουσιαστικά, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από εστίες πιθανής ανάφλεξης, αναπτυσσόμενες υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. σωληνώσεις ατμού, ακτινοβολία) από πυρξίες δημιουργίας σπινθέρων και από ενεργά υλικά. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Ημίνια παρασκευής: βλέπε φιάλη
Αρ. παρτίδας:

VEBUTANIL 24 EC

myclobutanil

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη Σύσταση: myclobutanil 24 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 73,8 % β/ο

Διασυστηματικό
μυκητοκτόνο
με προστατευτική
και θεραπευτική δράση

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Εύφλεκτο.
- Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.
- Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60035/4-1-2006

Περιεχόμενο: 200 κ.εκ.

Κάτοχος της Έγκρισης: Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: VECTOR AGRO SA

Διανομέας:

KAL. Ευθυμιάδης οφες

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ.2310 568556 • FAX:2310 798423 • e-mail: info@efthymidis.gr

ΘΑΣΙΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Μηλιά: για Ωίδιο, Φουζικλάδιο στη δόση 15-20κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση /σπρέυμα:40κ.εκ.) με 100-200 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέυμα. Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλων και 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 4.

Αχλαδιά, Μουσαμουλιά: για Φουζικλάδιο στη δόση 15-20κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση /σπρέυμα: 40κ.εκ.) με 100-200 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέυμα. Εφαρμογή στα στάδια της πράσινης, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 15-20 ημέρες αργότερα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 4.

Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκανιά: για Ωίδιο στη δόση 15-20κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση /σπρέυμα:50κ.εκ.) με 150-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέυμα. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στην πτώση των πετάλων, η δεύτερη στην απόσπαση του κάλυκα και η τρίτη 20 ημέρες αργότερα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Αμνέλη: για Ωίδιο στη δόση 8-12κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση /σπρέυμα:18κ.εκ.) με 50-150 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέυμα. Η βασική εφαρμογή γίνεται την άνοιξη όταν έχουν εκπτυχθεί 2-3 φύλλα και επανόληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Αγγούρι, Κοφοκύνθι, Καρπούζι, Πεπόνι: για Ωίδιο στη δόση 20-25κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση /σπρέυμα:25κ.εκ.) με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέυμα. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανόληψη ανά 7-14 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 5.

Τριανταφυλλιά: για Ωίδιο, Μελάνη Κηλίδωση στη δόση 20-25κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση /σπρέυμα:25κ.εκ.) με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέυμα. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανόληψη ανά 7-14 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 5.

Γαρφαλή: για Σκωρίαση στη δόση 20-25κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστη δόση /σπρέυμα:25κ.εκ.) με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέυμα. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 5.

Παρατηρήσεις:

-Η μικρή δόση συνιστάται για προληπτικές και η μεγάλη για θεραπευτικές εφαρμογές.

-Στις καλλιεργείες μηλοειδών, πυρηνόκαρπα, αμνέλη και κοκοκυνθοειδή υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλή ψέως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας. Σημειώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την αναδέυση.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση. Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελλεινικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΔΗ:

-Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσαμουλιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκανιά, Αμνέλη: 21 ημέρες

-Αγγούρι, Κοφοκύνθι, Καρπούζι, Πεπόνι: 7 ημέρες