Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: *Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.*

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: *Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Ιδεμβάριο - Φεβρουάριο).*

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: *Δεν απαιτείται.*

Φυτοτοξικότητα: *Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Στην αλβαδιά να αποφεύγεται ο συνδυασμός Vertimec βάδι, 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου Captan.*

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: ***Μπάμια, αλβαδιά, κυδώνια, αμπέλι:*** *28 ημέρες,* ***Εσπεριδοειδή:*** *10 ημέρες,* ***Ροδάκινα, νεκταρίνια, Βερίκοκα:*** *14 ημέρες,* ***Τομάτα, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκύθι, πιπεριά, πεπόνι, καρπούζι:*** *3 ημέρες,* ***Μαρούλι, ραδίκι, μαϊντανός, άνηθος, σέλινο:*** *14 ημέρες,* ***Ανθοκομικά:*** *6/ο,* ***Σκαρόλα (χειμερινό αντίδι):*** *7 ημέρες,* ***Δαμάσκηνα:*** *28 ημέρες.*

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Καλλιοπιστικά θερμοκηπίου (φυτά – βαλβοί και βολβώδη ανθικά φυτά – δένδρα άβμνοι και φυτώρια δοσικών δένδρων): *Για Τετράνυχο (Tetranychus urticae), Λυριόμυζα (Liriomyza trifolii), Θρίπα (Frankliniella occidentalis, Eriophyes spp.) και για Ψύλλη (Psylla spp) 100 κ.εκ./στρέμμα (max) η 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών. Μέχρι 4 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.* ***Μπλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά:*** *Για Ψύλλη (Psylla pyri, Psylla mali, Cacopsylla pyri, Epitrimerus pyri), Φυλλορυκτες (Lithocolletis sp.), Θρίπας (Frankliniella occidentalis, Thrips sp), Τετράνυχος (Tetranychus urticae), Πανόνυχας (Panonychus ulmi, Aculus schlechtendali, Aculus sp, Eryophyes spp) 112,5 κ.εκ./στρέμμα (max) η 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Πριν την ανθοφορία (<BBCH60) ή μετά την ανθοφορία (>BBCH 70). Μέχρι 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.* ***Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερίκοκα:*** *Για Ψύλλη (Psylla pyri, Psylla mali, Cacopsylla pyri, Epitrimerus pyri), Θρίπας (Frankliniella occidentalis, Thrips sp), Τετράνυχος (Tetranychus urticae), Πανόνυχας (Panonychus ulmi, Aculus schlechtendali, Aculus sp, Eryophyes spp) 100 κ.εκ./στρέμμα (max) η 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο μη ιοντικό προσκολλητικό (BBCH 09-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.* ***Αμπέλι:*** *Για Ακαρι της αμπέλου (Eriophyes vitis), Τετράνυχος (Eotetranychus carpini) 75 κ.εκ./στρέμμα (max) η 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολής. Οι μεγάλες δόσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. BBCH 13-79 (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία). Μέχρι 2 εφαρμογές με 14-21 ημέρες μεσοδιάστημα.* ***Τομάτα (Α/Θ):*** *Για Τετράνυχος (Tetranychus urticae), Λυριόμυζα (Liriomyza sp.), Θρίπας (Frankliniella occidentalis, Thrips sp) 120 κ.εκ./στρέμμα (max) η 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 12-89 (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό). Μέχρι 4 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.* ***Μελιτζάνα (Α/Θ), Πιπεριά (Α/Θ):*** *Για Τετράνυχος (Tetranychus urticae), Λυριόμυζα (Liriomyza sp.), Θρίπας (Frankliniella occidentalis, Thrips sp) 120 κ.εκ./στρέμμα (max) η 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων BBCH 12-89 (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό). Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες (Θερμοκηπίου). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες (Αγρού).* ***Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ):*** *Για Τετράνυχος (Tetranychus urticae), Λυριόμυζα (Liriomyza sp.), Θρίπας (Frankliniella occidentalis, Thrips sp) 120 κ.εκ./στρέμμα (max) η 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των μεγάλων πληθυσμών (BBCH 10-89). Μέχρι 4 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα* **Αγγούρι (Θ) και Κολοκύθι (Θ).** *Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα για Πεπόνι (Θ) και Καρπούζι (Θ).* ***Πεπόνι (Α),*** ***Καρπούζι (Α):*** *Για Τετράνυχος (Tetranychus urticae) 120 κ.εκ./στρέμμα (max) η 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των μεγάλων πληθυσμών (BBCH 10-89) (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.* ***Μαρούλι (Θ), Μαϊντανός (Θ), Άνηθος (Θ), Σέλινο (Θ):*** *Για Θρίπας (Frankliniella occidentalis) 50 κ.εκ./στρέμμα (max) η 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 12-55). Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.* ***Ραδίκι (Θ):*** *Για Frankliniella occidentalis 100 κ.εκ./στρέμμα (max) η 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 12-55). Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.* ***Σκαρόλα (χειμερινό αντίδι) (Α):*** *Για Θρίπας (Frankliniella occidentalis) 100 κ.εκ./στρέμμα (max) η 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 12-55). Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.* ***Δαμάσκηνα:*** *Για Τετράνυχος (Tetranychus urticae), Πανόνυχας (Panonychus ulmi, Aculus schlechtendali, Aculus sp, Eryophyes spp) 100 κ.εκ./στρέμμα (max) η 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BBCH 69-75). Μέχρι 1 εφαρμογή.*

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: *Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.*

L171559 GREC/4R

Vertimec®

1,8 EC

syngenta®

Abamectin (χημική ομάδα: avermectins)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Αναπ. & Τροφ.: 14423/08-04-13

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Abamectin 1,8% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 97,96% β/β (περιέχει Cyclohexanol)

Εντομοκτόνο – ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ***Syngenta Hellas A.E.B.E.***
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: Βι.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt

Xn

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- ***Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.***
- ***Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση ή κατάποση.***

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- ***Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.***

TM

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και τον ψεκασμό. • Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στους αγρούς που έχουν ψεκαστεί πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Το υδατικό και ο περιέχεις τους να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: *Να έχετε διαθέσιμη ,την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.* ***Επαφή με τα μάτια:*** *Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.* ***Κατάποση:*** *Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.* ***Επαφή με το δέρμα:*** *Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμείνει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.* ***Αναπνοή:*** *Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.*
Περαιτέρω θεραπευτική αγωγή – Αντίδοτο: *• Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Μία αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπρονικού οξέος. • Σε περίπτωση κατάποσης, να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός, μόνο εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα.*
• Περιέχει abamectin και Cyclohexanol.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακές ύδατα.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς και τους οργανισμούς μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:
- Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας ***10 μέτρων*** *- Για τις εφαρμογές σε αμπέλι να αφήνετε αψέκαστη ζώνη* ***10 μέτρων*** *ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη* ***3 μέτρων*** *σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού - Για τις εφαρμογές στα εσπεριδοειδή να αφήνετε* ***20 μέτρων*** *ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη* ***10 μέτρων*** *σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού - Για τις εφαρμογές στις λοιπές καλλιέργειες, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας* ***30 μέτρων*** *ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη* ***15 μέτρων*** *σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού*
Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: *- Για τις εφαρμογές σε εσπεριδοειδή να αφήνετε μία αψέκαστη ζώνη* ***15 μέτρων*** *- Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη* ***5 μέτρων*** *από ακαλλιέργητες εκτάσεις*
Πιθανώς επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι μελισσοκόμοι της περιοχής να ενημερωθούν ώστε τα μέλισσα να απομακρυνθούν από την περιοχή για τουλάχιστον: *• 39 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών • 43 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες τομάτας υπαίθρου • 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμοκηπίου για εξαπάτηση βομβίνων/ μελισσών στα θερμοκήπια.*

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: *Ψεκασμός φυλλώματος.*

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: *Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και όπου συνιστάται λαδιού ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας.*

Αρ. Παρτίδας:
Ημ/νία Παραγωγής: