

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο. • Μη πετάτε τα κενά μέσα συσκευασίες ή το εναπομείναν οκείασμα ή ψεκαστικό υγρό στις αποχετεύσεις. • Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). • Σε περίπτωση κατάποσης συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό και επιδείξτε του τον περιέκτη ή την ετικέτα. • Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. • Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα και κατάλληλα γάντια. • Προστατεύετε τα μάτια και το πρόσωπο, τόσο κατά τη παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος όσο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. **Κατάποση:** Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Αναπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέος. Σε περίπτωση κατάποσης, να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός, μόνο εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

L174685 GREC/9R



Vertimec[®] Pro
1,8 SC

syngenta[®]

Abamectin (χημική ομάδα
αβερμεκτινών)

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.:
14446/07-06-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Abamectin 1,8 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 98,25 β/β
(περιέχει διαλύτη

1,2-βενζισοθειαζολ-3 (2H)-όνη)

Εντομοκτόνο – ακαρεοκτόνο
στομάχου και επαφής.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση
της συσκευασίας

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: Βί.Π.Ε. θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση ή κατάποση.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Μην μουλύνετε το νερό με το προϊόν
ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς και τους οργανισμούς μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

- Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, να αφήνεται μίαν **αψέκαστη** ζώνη προστασίας **10 μέτρων**

- Για τις εφαρμογές σε αμπέλι να αφήνεται **αψέκαστη** ζώνη **10 μέτρων** ή **εναλλακτικά** **αψέκαστη** ζώνη **3 μέτρων** σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού

- Για τις εφαρμογές στα εσπεριδοειδή να αφήνεται **20 μέτρων** ή **εναλλακτικά** **αψέκαστη** ζώνη **10 μέτρων** σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού

- Για τις εφαρμογές στις ρομπές καλλιέργειες, να αφήνεται μίαν **αψέκαστη** ζώνη προστασίας **30 μέτρων** ή **εναλλακτικά** **αψέκαστη** ζώνη **15 μέτρων** σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού.

Τοξικό για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.

Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Τρόπος δράσης: Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από αστία.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. Έγχυση στον κορμό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και όπου συνιστάται λιπίδι ανακατεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τηλέως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνονται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για τη διαχείριση κινδύνων ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να εφαρμόζεται το σκεύασμα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του και σε εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. Να μην πραγματοποιούνται δύο συνεχόμενες εφαρμογές με το ίδιο προϊόν, αλλά να εναλλάσσεται με εντομοκτόνα ή ακαρεοκτόνα που δρουν με διαφορετικό τρόπο.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεται στις ψεκασμένες περιοχές χωρίς μέσα ατομικής προστασίας για τουλάχιστον 12 ώρες μετά τον ψεκασμό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις ευκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργεια μαργαρίτας της ποικιλίας Shasta (*leucanthemum* sp.)

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Τομάτα, μελιτζάνα, πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθα, φράουλα: 3 ημέρες. Σμύουρα, βατόμουρα, πικραλίδα και ροπά, μαρούλι και ροπά σαλατικά, πράσο (Α): 7 ημέρες. Εσπεριδοειδή: 10 ημέρες. Μαρούλι και ροπά σαλατικά (Θ), ροδάκινα, νεκταρίνια, βερικόκα: 14 ημέρες.

Μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα, αμύγδα: 28 ημέρες.

L174685 GREC/9R



Abamectin (χημική ομάδα αβερμεκτινών)

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 14446/07-06-2013

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Abamectin 1,8 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 98,25 β/β
(περιέχει διαλυτή 1,2-βενζισοθειαζολ-3 (2H)-όνη)

Εντομοκτόνο – ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε.

Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13

www.syngenta.gr

ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Επιδβαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση ή κατάποση.

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Φάσμα δράσης:

Εσπεριδοειδή (πορτοκαλί, μανταρινιά, κλημεντίνη, λεμονιά): • Για Φυλλόκκινο 37,5-75 κ.εκ./στρέμμα ή 37,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-200 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, στους νεαρούς βλαστούς, με παραφινικό λάδι 0,5% ή άλλο μη ιονικό προσκολλητικό. Μέχρι 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. • Για Φυλλόκκινο 75 κ.εκ./στρέμμα ή 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, στους νεαρούς βλαστούς, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,5% ή άλλο μη ιονικό προσκολλητικό. 1 εφαρμογή. • Για Πανόλυγχο και Τετράνυχο 75-120 κ.εκ./στρέμμα ή 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-160 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,5% ή άλλο μη ιονικό προσκολλητικό. Μέχρι 3 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Μηρόειδη** (Μηλιά, Αχλαδιά): Για Φύλλα, Πανόλυγχο, Τετράνυχο, *Aculus schlechtendali*, *Eriophyes piri*, *Eritimerus pyri*, *Leucotera* spp., *Phylloxera* *blancardella* 75-120 κ.εκ./στρέμμα ή 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-160 λίτρα/στρέμμα. Από την πτώση των πετάλων και την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25% ή άλλο μη ιονικό προσκολλητικό. Μέχρι 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. **Πυρηνόκαρπα** (ροδάκινα, νεκταρίνια, βερικοκιά): Για Πανόλυγχο, Τετράνυχο, *Aculus fockeui*, *Thrips* spp., *Teniothrips* spp., *Frankliniella* spp. 75-125 κ.εκ./στρέμμα ή 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-125 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Στις καλλοκαρινές εφαρμογές, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,1% ή άλλο μη ιονικό προσκολλητικό. Μέχρι 2 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. **Δαμασκηνιά:** Για Πανόλυγχο, Τετράνυχο, *Aculus fockeui*, *Thrips* spp., *Teniothrips* spp., *Frankliniella* spp. 75-125 κ.εκ./στρέμμα ή 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-125 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Στις καλλοκαρινές εφαρμογές, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,1% ή άλλο μη ιονικό προσκολλητικό. 1 εφαρμογή. **Αμπέλι:** Για Πανόλυγχο, Τετράνυχο, *Eotetranychus carpini*, *Lobesia botrana*, *Eupoecilia ambiguella*: • 75 κ.εκ./στρέμμα ή 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Μέχρι 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. • 55-75 κ.εκ./στρέμμα ή 55-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Με την έναρξη της ωοτοκίας και δύο εβδομάδες μετά. Μέχρι 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. **Τομάτα** (Α), **μελιτζάνα** (Α), **πεπόνι** (Α/Θ), **καρπούζι** (Α/Θ), **κολοκύθα** (Α/Θ): • Για Τετράνυχο, *Aculus lycopersici* 30-120 κ.εκ./στρέμμα ή 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-200 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Μέχρι 3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. • Για Θρίπα 75-120 κ.εκ./στρέμμα ή 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-160 λίτρα/στρέμμα. Στα πρώτα προνυμφικά στάδια. Μέχρι 3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. • Για Λυγισμύζα 30-120 κ.εκ./στρέμμα ή 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-200 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων στωών. Μέχρι 2 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. **Φρούτα** (Α/Θ): • Για Τετράνυχο 50 κ.εκ./στρέμμα ή 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-125 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Μέχρι 2 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. • Για Τετράνυχο 120 κ.εκ./στρέμμα ή 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. 1 εφαρμογή. • Για Θρίπα 75-120 κ.εκ./στρέμμα ή 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-160 λίτρα/στρέμμα. Στα πρώτα προνυμφικά στάδια. Μέχρι 3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. **Σμέουρα** (Α), **Βατόμουρα** (Α): Για Πανόλυγχο και Τετράνυχο 75-120 κ.εκ./στρέμμα ή 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-160 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. 1 εφαρμογή.

Μαρούλι και **Αιολιά** **Ιλδα**, **μαρούλι iceberg**, **μαρούλι παϊδάκι**, **μαρούλι κόκκινο**, **αντάπι**, **κάρδαμο**, **ρόκα**, **άγρια ρόκα**, **κόκκινο αντάπι**, **φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp.:** (Α/Θ) και **Εσκαρόλ**, **πικραλίδα**, **άγριο ραδίκι**, **κόκκινο κισσώρι**, **ραντίτσιο**, **αντίδια**, **ραδίκια**: (Α1): Για Θρίπα με εφαρμογή στα πρώτα προνυμφικά στάδια και για Λυγισμύζα με την εμφάνιση των πρώτων στωών: 30-100 κ.εκ./στρέμμα ή 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-160 λίτρα/στρέμμα. Μέχρι 3 εφαρμογές με επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. Από τη στιγμή της μεταφύτευσης έως 21 ημέρες από τη μεταφύτευση. **Πράσο:** • Για Τετράνυχο 30-100 κ.εκ./στρέμμα ή 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Μέχρι 3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. • Για Θρίπα 30-50 κ.εκ./στρέμμα ή 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Μέχρι 3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. • Για Λυγισμύζα 30-50 κ.εκ./στρέμμα ή 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων στωών. Μέχρι 2 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα. **Καλλιμαστικές και ανθοκομικές καλλιέργειες, Κομμένα λουλούδια, Φυτάρια ποώδων και θαμνώδων φυτών, Φυλλόσφορα – Κυνοδόφρα για φύτευση σε δρόμους και πάρκα:** • Για Λυγισμύζα 50-150 κ.εκ./στρέμμα ή 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων στωών. • Για Θρίπα 50-150 κ.εκ./στρέμμα ή 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 66-200 λίτρα/στρέμμα. Στα πρώτα προνυμφικά στάδια. • Για Τετράνυχο 50-150 κ.εκ./στρέμμα ή 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 200-300 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. • Για *Cameralaria ohridella*, *Thaumetopoea pityocampa* 10-40 κ.εκ. σκευασματος ανά λίτρο νερό. Εφαρμόστε το προϊόν μετά την ανθοφορία, στα πρώτα προνυμφικά στάδια. • Για *Corythucha ciliata*, *Aphis* spp., *Acali* spp., *Tetranychus* spp., *Eriofid* spp 10-40 κ.εκ. σκευασματος ανά λίτρο νερό. Εφαρμόστε το προϊόν, κατά τη νέα βλάστηση των φυτών.*

Παρατηρήσεις:

* Η έγκυση στον κορμό πρέπει να πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό από εξειδικευμένο χρήστη. Για την εφαρμογή του προϊόντος με έγκυση στον κορμό, ο χρήστης πρέπει να φορά ατομικά μέσα προστασίας για την προφύλαξη της αναπνευστικής οδού, του δέρματος, των οφθαλμών/προσώπου, τόσο κατά την εφαρμογή όσο και κατά την προετοιμασία του μίγματος και την διαχείριση του στο τέλος της εφαρμογής. Κατά την εφαρμογή ή πριν την εφαρμογή του σκευασματος μέσω έγκυσης στον κορμό, να τοποθετούνται δοχεία, τοποθετημένα κάτω από τα δένδρα, με σκοπό την αποφυγή πιθανών διαρροών. Η περιοχή που έχει εφαρμοστεί το προϊόν μέσω έγκυσης, θα πρέπει να περιφραχθεί για να αποτραπεί η είσοδος και η πρόσβαση. • Μη ψεκάζεται όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τους ψεκασμούς, πχ με παρουσία ανέμου. • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για να εξασφαλίσετε επαρκή διαβροχή και καλή κάλυψη της καλλιέργειας. • Ανεξαρτήτως από τους όγκους νερού, συνιστάται να τηρείτε τις δόσεις ανά στρέμμα που αναφέρονται παραπάνω.

Αρ. Πατίδας:
Η/ν/ία Παραγωγής:

