

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε ατμούς ή σταγονίδια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην προκληθεί εμετός. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια κρατώντας τα ανοικτά με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα και αν τα συμπτώματα επιμένουν καλέστε γιατρό λέγοντάς του ότι το σκεύασμα περιέχει διαλυτή υδρογονάνθρακα.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

• Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους, προστατευμένα από το κρύο. • Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. • Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και εφόσον πρόκειται να ακολουθήσει καλλιέργεια δημητριακών, είναι αναγκαία μία περίοδος αναμονής 3 μηνών πριν τη σπορά. • Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα με τη φορά του ανέμου. • Ψεκάστε με πίεση ως 3 atm (40-50 psi) Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. • Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. • Μετά το ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με διάλυμα 50ml Agral ανά 100/L νερού.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ/ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βρένε φιάλη

VETRI 24 EC

clethodim

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση : clethodim : 24% β/ο
Bonθ. Ουσίες : 72,84 % β/β

**Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο
με διασυστηματική δράση
σε αγρωστώδη ζιζάνια**



ΕΙΡΕΣΙΣΤΙΚΟ

- Ερεθίζει τα μάτια.
- Επιβλαβές για του υδρόβιους οργανισμούς

Αρ. Εγκρ. Κυβ. Υπ. Γεωργίας 7777/ 7-3-2006

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Vector Agro SA., Ελλάδα

Εργοστάσιο παρασκευής σκευάσματος: ArystaLifescience S.A.S., Γαλλία
Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομέας:

Κ.Ι. Ευθυμιόδη οβες

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.)	ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
BAMBAKI ZACHAROTEUTLA PATATA TOMATA	Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Αγριοβρώμη (<i>Avena sterilis</i>) Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Σετάρειες (<i>Setaria</i> spp.)	75-100 + 0,5 % λάδι*	Ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε στάδιο από 2-3 φύλλων μέχρι αδελφώματος.
	Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i>)	100-125 + 0,5 % λάδι*	Ψεκασμός στο στάδιο των 20-30 εκ.
	Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>)	125-150 + 0,5 % λάδι*	Ψεκασμός στο στάδιο των 20-30 εκ.

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/ στρέμμα.

Παρατήρηση:

*Να χρησιμοποιείται ένα μη φυτοτοξικό παραφινικό ορυκτέλαιο.

Τρόπος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση έως 3 atm με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα με μπεκ σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Βάζουμε σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης, προσθέτουμε το σκεύασμα και αναδεύουμε 2-3 λεπτά, προσθέτουμε το λάδι & απογεμίζουμε το βυτίο με συνεχή ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Δε συνιστάται ο συνδυασμός του με άλλα σκευάσματα, εκτός από την προσθήκη λαδιού που πρέπει πάντα να γίνεται.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

- Ζαχαρότευτλα: 110 ημέρες.
- Τομάτα: 30 ημέρες.
- Πατάτα: 60 ημέρες.
- Βαμβάκι: 120 ημέρες.

