

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**  
• Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης. • Μέχρι 2 εφαρμογές σε μία καλλιεργητική περίοδο. • Συγκεκριμένα, το σκεύασμα και τα άλλα προϊόντα της ίδιας ομάδας δράσης να εφαρμόζονται σε «πολύ» εφάρακτον, όχι μεγαλύτερο από τη διάρκεια μιας γενιάς του εντόμου στόχου, και όχι περισσότερες από 2 φορές στο ίδιο διάστημα. • Να ακολουθείτε διαφορετικούς διαφορετικούς τρόπους δράσης. • Να αποφεύγεται η χρήση χαμηλότερων δόσεων από τις εγκεκριμένες, είτε όταν εφαρμόζεται μόνο του είτε και σε μείγμα προϊόντων. • Να εφαρμόζεται, όσο είναι δυνατό, στα πιο ευαίσθητα στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μελιτζάνα, τομάτα:** 7 ημέρες. Αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι και κολοκυθάκι: 3 ημέρες. Μπλή, αχλάδι, ροδάκινο, νεκταρίνι: 14 ημέρες.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                                     | Στόχος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Δόσεις σκευάσματος |                              |                                                                                                             | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | κ.εκ./ στρέμμα     | κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού/ λίτρα/ στρέμμα                                                                            |                                                      |
| Μηλοειδή<br>Μπλή<br>Αχλάδι                                                                                                          | Καρποκάψα (Cydia pomonella) Cydia molesta)<br>Φυλλοδέτες (Argyrotaenia sp., Pandemis sp., Adoxophyes sp., Archips sp.)<br>Φυλλορύκτες (Lecanotia scitella, Phyllonectis spp., Nepticula spp., Lyonella spp.)<br>Πυρρίκη (Ostrinia nubilalis)<br>Τετρανύχους (Eriophyes pyri, Ectrimerus urticae, Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus sp) | 75-112,5           | 75                           | 100-150                                                                                                     | 1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες           |
|                                                                                                                                     | Ψύλλα (Psylla pyri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                              | Εφαρμογή στα αυγά ή όταν οι πρώτες νύμφες εμφανιστούν. BBCH 69-89                                           |                                                      |
| Πυρηνόκαρπα<br>Ροδάκινα<br>Νεκταρίνια                                                                                               | Καρποκάψα (Cydia molesta)<br>Πυρρίκη (euzophera bigella, Ostrinia nubilalis)<br>Τετρανύχους (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus sp)<br>Θρίπες (Frankliniella occidentalis, taeniothrips spp., thrips spp.)                                                                                                                              | 75-112,5           | 75                           | 100-150                                                                                                     | 1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες           |
|                                                                                                                                     | Ανάρια (Anarsia lineatella)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                              | Εφαρμογή στην έναρξη της προβόλης ή στην έναρξη της 2ης γενιάς των βλαστοκυττάρων του ροδάκινου. BBCH 69-89 |                                                      |
| Λαχανικά<br>Θερμοκηπίου<br>Τομάτα<br>Μελιτζάνα<br>Πεπόνι<br>Καρπούζι<br>Κολοκυθάκι<br>Αγγούρι                                       | Πράσινο ακουήκη Φυλλοφάγος κάμπιες (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis, Ostrinia nubilalis)<br>Τετρανύχους (Tetranychus urticae)<br>Λυριόμυζα (Liriomyza spp.)                                                                                                                                                        | 80                 | 80                           | 100                                                                                                         | 1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες            |
|                                                                                                                                     | Tuta absoluta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80                 | 80                           | 100                                                                                                         | BBCH 12-89                                           |
| <b>Παρατηρήσεις:</b> Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού που χρησιμοποιούνται, να τηρείτε τις δόσεις ανά στρέμμα για κάθε καλλιέργεια. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                              |                                                                                                             |                                                      |

L172204 GREC/5R



Voliam Targo®

063 SC

syngenta®

Chlorantraniliprole + Abamectin

**Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)**

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 14447/ 7-6-2013

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**

Chlorantraniliprole 4,5% β/ο

Abamectin 1,8 % β/ο

**Βοηθητικές ουσίες 93,49% β/β**

**Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση της καρποκάψας, φυλλορυκτών, φυλλοδετών και τετρανύχων, ψύλλας στα μηλοειδή, καρποκάψας, τετρανύχων, θρίπων και ανάρσιες στα πυρηνόκαρπα και λεπιδοπτερόν, τετρανύχων και λυριόμυζας στα λαχανικά θερμοκηπίου.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

**Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.,  
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13  
www.syngenta.gr  
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lte

Xn



**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ**

- **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης και όταν εισπνέεται.**
- **Επιβλαβές:** κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση, όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.

N



**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

- **Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες ανεπιθύμητες επιδράσεις στο υδρόβιο περιβάλλον.**

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε πριν τρώτε, μην πίνετε και μην καννίζετε. • Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. • Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. • Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. • Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. • Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτία δεδομένων ασφαλείας.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά ελαβεζόμενο χώρο και προσφυλάξτε τον από την υποθερμία. Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

**Επαφή με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

**Κατάποση:** Χρησιμοποιήστε επανειλημμένα ιατρικό άνθρακα με μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγώστε σιδήροτο εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

**Επαφή με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά το προσβεβλημένο μέρος του σώματος με νερό και σαπούνι.

**Αναπνοή:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένεται τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις αγροτικές εγκαταστάσεις και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιον ψεύκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων μέχρι τα σώματα των επιφανειακών υδάτων για τους οικολογικούς.

**Επικινδύνουν για τις μέλισσες.**

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνους μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι μελισσοκόμοι της περιοχής να ενημερωθούν ώστε τη μέλίσσια να απομακρυνθούν από την περιοχή για τουλάχιστον 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμοκηπίου για εξαπόλυση βομβίνων/ μελισσών στα θερμοκήπια.

**Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Συνδυάζει 2 δραστικά συστατικά με διαφορετικό τρόπο δράσης. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από αστία.

Το Chlorantraniliprole είναι μη διασυστηματικό εντομοκτόνο που προκαλεί το θάνατο των εντόμων δια στόμακού με κατάποση. Είναι πολύ αποτελεσματικό στα λεπιδοπτερά αήλη και σε κολεόπτερά και δίπτερα σε χαμηλές δόσεις. Η Abamectin έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Είναι αποτελεσματικό ενάντια στα ακάρεα. Ανήκει στη χημική ομάδα των αβερμεκτινών.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Αναδεύετε και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο σφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τρίψιμο τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προφυλαγμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποθεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Σε περίπτωση ποικιλιών ελάσιμα διαδεδομένων ή πρόσφατα εισαγμένων στη χώρα, να γίνουν δοκιμές μικρής έκτασης πριν επεκτείνεται την εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Αρ. Παρτίδας:  
Ημ/νία Παραγωγής:

