



800 κ.εκ. €

#### Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγ. Σύνθεση: fluopicolide: 625% β/ο+ propanoscarb hydrochloride: 625% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 34,18 % β/β

## Μυκητοκτόνο

για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στην Πατάτα, στο Αγγούρι, στο Κολοκυθάκι, στην Κολοκύθα, στο Πεπόνι, στο Καρπούζι, στο Μαρούλι (στρογγυλό), στο Λάχανο, στο Μπρόκολο και στο Κουνουπίδι.

#### ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

● Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης Υπεύθυνος για την  
τελική συσκευασία και σήμανση:  
Bayer Ελλάς ABEE

#### Βολάρε 687/5 SC

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στην Πατάτα, στο Αγγούρι, στο Κολοκυθάκι, στην Κολοκύθα, στο Πεπόνι, στο Καρπούζι, στο Μαρούλι (στρογγυλό), στο Λάχανο, στο Μπρόκολο και στο Κουνουπίδι.

Το fluopicolide είναι ένα νέο μυκητοκτόνο με διελασματική δράση και αποπληαστική κίνηση ανήκει σε μια νέα χημική ομάδα (ακυλοπικολίδες) και δρα σε πολλά στάδια του βιολογικού κύκλου του περονόσπορου.

Το propanoscarb hydrochloride παρουσιάζει μικρή διασυστηματική κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων του περονόσπορου.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

#### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

**Πατάτα:** Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*) **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Προληπτικές εφαρμογές. Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσβολής (BBCH 21-81). **Δόση:** 120-160 κεκ/ στρέμμα (120-160 κεκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα / στρέμμα. **Αγγούρι, Κολοκύθι, Κολοκύθα (υπαίθρου):** Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσβολής (BBCH 21-83). **Δόση:** 120-160 κεκ./στρέμμα (120-160 κεκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

**Αγγούρι, Κολοκύθι (θερμοκηπίου):** Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσβολής (BBCH 21-83). **Δόση:** 120-160 κεκ./στρέμμα (120-128 κεκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-125 λίτρα/στρέμμα.

**Πεπόνι, Καρπούζι (υπαίθρου):** Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** BBCH 21-86. **Δόση:** 140-160 κεκ./στρέμμα (140-160 κεκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

**Πεπόνι, Καρπούζι (Θ):** Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** BBCH 21-86. **Δόση:** 140-160 κεκ./στρέμμα (140-160 κεκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

**Μαρούλι (Υ) (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού):** Περονόσπορος (*B Bremia lactucae*). **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Εφαρμογή μετά το τρίτο πραγματικό φύλλο (BBCH 13). **Δόση:** 140-160 κεκ./στρέμμα (140-160 κεκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

**Μαρούλι (Θ) (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού):** Περονόσπορος (*Bremia lactucae*). **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** BBCH 13-49. **Δόση:** 140-160 κεκ./στρέμμα (140-160 κεκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

**Λάχανο λευκό, Λάχανο κόκκινο, (υπαίθρου):** Περονόσπορος (*Peronospora spp*). **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** BBCH 13-49. **Δόση:** 160 κεκ./στρέμμα (160 κεκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

**Κουνουπίδι, Μπρόκολο:** Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** BBCH 13-49. **Δόση:** 160 κεκ./στρέμμα (160 κεκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

**ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ - ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΒΑΣΕΩΝ:**

**Πατάτα:** 4 ανά 7-12 ημέρες.

**Αγγούρι-Κολοκύθι-Κολοκύθα (υπαίθρου), Πεπόνι-Καρπούζι (υπαίθρου):** 2 ανά 7-12 ημέρες.

**Αγγούρι- Κολοκύθι (θερμοκηπίου), Πεπόνι-Καρπούζι (θερμοκηπίου):** 3 ανά 7-12 ημέρες.

**Λάχανο λευκό - Λάχανο κόκκινο (υπαίθρου):** 3 ανά 7-12 ημέρες.

**Μαρούλι (Υ) (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού):** 1

**Μαρούλι (Θ) (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού):** 1-3 ανά 7-12 ημέρες.

**Κουνουπίδι, Μπρόκολο:** 1-3 ανά 7-12 ημέρες.

#### Παρατηρήσεις:

1. Η δόση των 120 κεκ/στρ. θα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά ενώ η δόση των 160 κεκ/στρ. θα πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά σε περίπτωση που ο κίνδυνος εμφάνισης της προσβολής είναι υψηλός ή θεραπευτικά στα αρχικά στάδια έναρξης της προσβολής.

2. Για όγκους νερού μεγαλύτερους των 100 λίτρα/στρ. η μέγιστη δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 160 κεκ/στρ.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Το προϊόν να μην εφαρμόζεται σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση και αμυδρή εδάφη. Προκειμένου να περιασφεί ο

κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας των παθογόνων στο Volare 687/5 SC συνιστάται οι εφαρμογές να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων διαφορετικού τρόπου δράσης με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** **Πατάτα:** 7 ημέρες. **Αγγούρι, Κολοκύθι (Θ):** 1 ημέρα. **Αγγούρι, Κολοκύθι, Κολοκύθα (Υ):** 3 ημέρες. **Πεπόνι, Καρπούζι (Υ+Θ):** 3 ημέρες. **Λάχανο λευκό, Λάχανο κόκκινο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι (Υ):** 4 ημέρες. **Μαρούλι (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού) (Θ):** 4 ημέρες. **Μαρούλι (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού) (Υ):** 7 ημέρες.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** ● Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. ● Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. ● Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. ● Να φοράτε κατάλληλα γάντια. ● Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. ● Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. ● Συμπληρώστε ο χρήστης να φορέσει αδιαπέραστη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή. ● Να μην εισέρχεστε στους ψεκασμένους αγρούς πριν τα φύλλα να έχουν πλήρως στεγνώσει. Σε περίπτωση που οι εργάτες χρειαστεί να εισέλθουν στους ψεκασμένους αγρούς αμέσως μετά τον ψεκασμό αυτοί θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ξαπλωτό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Απομακρύνετε τους φακούς επαφής και πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Προστατέψτε τον υγιή οφθαλμό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα και χορηγήστε ενεργό άνθρακα. Καλέστε αμέσως γιατρό. **Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα:** λήθαργος, αταξία, συσπασίες. **Κίνδυνος:** Το συγκεκριμένο προϊόν, παρόλο που είναι καρβαμικό, δεν είναι παρεμποδιστής της χοληστερόλης. **Θεραπεία:** Αρχική θεραπεία συμπτωματική. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. **Αντενδείξη:** Ατροπίνη. Συνήθως δεν απαιτείται γαστρική απόπλυση. Εάν καταποθεί αρκετή ποσότητα σκευάσματος (περισσότερη από μία γουλιό) χορηγήστε ενεργό άνθρακα και θειικό Νάτριο. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 7793777.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΎΔΑΡΘΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΎΔΑΡΘΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Bayer

Διανομέας: Bayer Ελλάς ABEE  
Συμροί 18-20, 15125 Μαρούσι  
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100



GR 80263260 B