

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αναπνέετε το φεκαστικό νέφος. • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. • Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκάσμο.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινιάσους μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Απαγορεύεται η χρήση του σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια ή υπόγεια ύδατα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ'ευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφολογικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: —

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Νερό και απορρυπαντικό.

ΤΕΛΕΥΤΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες): Εσπεριδοειδή: 21, Αχλαδιά, Καπνός, Τομάτα (υπαίθρου, θερμκηπίου), Αγγούρι (θερμκηπίου): 7 ημέρες, Ροδακινιά, Πατάτα: 14 ημέρες, Βαμβάκι: 28 ημέρες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ — ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του απαβαθιστή συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα και τα κομμάτια με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας



Warrant® 200 SL

Imidacloprid (μιντακλοπρίντ)

Υγρό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: imidacloprid 20% β/ο
(χημική ομάδα νεονικοτινοειδών)
βοηθητικές ουσίες 82,34% β/β

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Εγκρ. Κυκλοφορίας: 14199/10-09-2007

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Παρασκευαστής - Κάτοχος της άδειας:  **CHEMINOVA**
CHEMINOVA A/S, P.O. Box 9,
DK-7620 Lemvig, Δανία.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449,
153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλ: 210-6860130, www.basf-agro.gr

® Σήμα κατατεθέν CHEMINOVA

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ — ΣΤΟΧΟΙ — ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού)

Ψεκάσμοι καλύψεως ή ριζοποτίσματα.

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέϊτ-φρουτ): Εριώδης αλευρώδης. Δόση: 75 κ.εκ. Ψεκάσμος φυλλώματος, μετά την περίοδο της ανθοφορίας: με την εμφάνιση των νυμφών του εντόμου (στάδια L1 και L2). Φυλλοκνίστης. Δόση: 50-75 κ.εκ. Ψεκάσμος φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής, μετά την περίοδο της ανθοφορίας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρέμμα. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 20-30 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2. **Αχλαδιά:** Ψύλλα αχλαδιάς. Δόση: 60 κ.εκ. Ψεκάσμος φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί μετά την καρπώδεια έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1. **Ροδακινιά:** Αφίδες. Δόση: 25-30 κ.εκ. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Μπορεί να εφαρμοστεί μετά την καρπώδεια έως την έναρξη αλλαγής χρώματος (BBCH 71-79). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 λίτρα/στρέμμα. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 28 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2. **Τομάτα υπαίθρου:** Αφίδες, Αλευρώδης. Δόση: 50 κ.εκ. Ψεκάσμος φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2. **Τομάτα θερμοκηπίου:** Αλευρώδης. Δόση: 75-125 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Εφαρμογή με το νερό της άρδευσης (ριζοποτίσμα). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2. **Αγγούρι (θερμκηπίου):** Αλευρώδης. Δόση: 75-125 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Εφαρμογή με το νερό της άρδευσης (ριζοποτίσμα). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2. **Βαμβάκι:** Αφίδες. Δόση: 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Εφαρμογή μετά την περίοδο της ανθοφορίας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2. **Πατάτα:** Αφίδες, Δορυφόρος. Δόση: 50 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Εφαρμογή με την έναρξη της προσβολής και μέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει μελίτωμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2. **Καπνός:** Αφίδες. α) Δόση: 25-60 κ.εκ. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Ο ψεκάσμος επαναλαμβάνεται με την επανεμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 20-30 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2. β) Δόση: 50-100 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Ριζοποτίσμα με το νερό της μεταφύτευσης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1.

* Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.

Παρατηρήσεις

1. Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα «ολοκληρωμένης αντιμετώπισης» συνιστάται να εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου *Cales noacki* ωρίμων για ωτοκία.
2. Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός, παρουσία μελιτωμάτων), ο ψεκάσμος επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο.
3. Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (*Phyllocnistis citrella*) η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής.
4. Στα εσπεριδοειδή, σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής εριώδη αλευρώδης (μικτός πληθυσμός), συνιστάται η προσθήκη (TANK-MIX) θειικού λαδιού σε δόση 1 λίτρου.
5. Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ριζοποτίσμα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών.
6. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.
7. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθησης.
8. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).