

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί.
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210.77.93.777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του
(να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα)

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Αποθηκευόμενο στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό και δροσερό παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αρ. Παρτίδας, Ημ. Παραγωγής:βλέπε επί της συσκευασίας

YAGI SL

1-naphthyl acetic acid (1 ναφθλασέτικ άσιντ) 3.1% β/ο (υπό μορφή άλατος νατρίου)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγ. σύνθεση: 1-naphthyl acetic acid 3.1 % β/ο
(υπό μορφή άλατος νατρίου)
βοηθ. ουσίες 96.47 % β/β

Αριθμός έγκρ. κυκλ.:
8186/19.8.08

ΑΝΤΙΚΑΡΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΣΕ ΜΗΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΙΕΣ.

**ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο:
300κ.εκ.



Κάτοχος της Εγκρίσης :
Amvac Chemical UK Limited,
Surrey Technology Centre,
40 Occam Road,
The Surrey, Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YG, UK,
Ηνωμένο Βασίλειο

**Υπεύθυνος επικοινωνίας
και για την τελική διάθεση στην αγορά:**



ΑΘΗΝΑ: Φιλέμνικ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 1203, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σινδος, τηλ. 2310.797.907
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr

ΠΕΔΙΟ - ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ για ενδυνάμωση του ποδίσκου και περιορισμό της καρπόπτωσης με δόση 32 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού. Μεγ. αριθ. εφαρμ. ανά καλ. περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 21 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): 20-80. Ψεκάζεται 7-10 ημέρες πριν τη συνηθισμένη πτώση των καρπών (καρπίδιο, στάδιο BBCH 69-71). Η δράση του σκευάσματος αρχίζει μία βδομάδα από την ημέρα του ψεκασμού και διαρκεί 2-3 βδομάδες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται με ζεστό και ξηρό καιρό.

Παρατηρήσεις:

Το εύρος του ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της κόμης των δέντρων.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός με καλό λούισμο των φυτών και ιδιαίτερα των ποδίσκων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό με το 1/3 του απαιτούμενου νερού και προσθέστε το σκεύασμα. Υπό συνεχή ανάδευση προστίθεται το υπόλοιπο νερό. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος, πρέπει να είναι καθαρό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Προστασία των καταναλωτών

(Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή): Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής.