

# ΖΑΡΡΥ 96DP Ζάπυ

## Μυκητοκτόνο

Σκόνη επίπασης (DP)  
Sulphur (σούλφουρ) 96%

Xn-Xi



**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ  
ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ**

## Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται
- Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα

Εγγυημένη Σύνθεση: **sulphur 96% B/B**  
Βοηθητικές ουσίες: **3.03% B/B**

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αρ. Εγκρ. κυκλ. Υπ. Γεωργίας: 6930/8-1-2004

Υπεύθυνος επικοινωνίας:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.  
Δ. Γλυνού 32, 542 49, Θεσσαλονίκη  
Τ.Κ. 542 49  
Τηλ.: 2310-334 377  
Fax: 2310-334 378  
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com

Κάτοχος της έγκρισης – Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:  
MULINI DI ZOLFO  
6-8 Underwood Street London N1 7JQ UK

# Καθαρό Βάρος 1 κιλό

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- Μην αναπνέετε την σκόνη.
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- Σε περίπτωση κατάσπασης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Αποφύγετε την διάθεση του στο περιβάλλον.
- Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Για την ασφαλή κίνηση των ανθρών και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Το υλικό αυτό και ο περιεκτης του να αναποθεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό /προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

**Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.**

### ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΧΗΚΕΥΣΗΣ

Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΗ kg/στρέμμα (ανάμ.)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αμπέλι	Όιδιο (Uncinula necator)	2-3	Α) Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκατ. Β) κατά την άνθηση Γ) μετά το δέσιμο των ραγών Δ) Κάθε 15-20 μέρες μέχρι το στάδιο του «γαλιαματος» των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής.
Τομάτο, Μελιτζάνα, Πεπεριά	Όιδιο (Leveillula taurica)	2-3	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες
Αγγούρι, κολοκύθι, καρπούζι, πεπόνι.	Όιδιο (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)	2-2,5	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες
Τριανταφυλλιά	Όιδιο (Sphaerotheca pannosa)	2-2,5	Προληπτικά μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκατ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής

### Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Αμπέλι, Τομάτα, Πεπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι, Τριανταφυλλιά: **4**

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται: εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Στις καλλιεργείες αμπέλι και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα γεωργικών προετοιμοπονήσεων.
- Το θεαίφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων.
- Το θεαίφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Με επίπαση, ως έχει.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Μην χρησιμοποιείτε το ΖΑΡΡΥ 96DP μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή ποτίζου, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28°C) παρουσιάζονται εγκαυματα στα φυτά. Το θεαίφι μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν συνδυάζεται με άλλο γεωργικό φάρμακο. Εφαρμόζεται μόνο του.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** 7 ημέρες

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας  
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας  
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του

