

Προσοχή



Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.



Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη:

Οι κενές φιάλες/δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Zulu®

10EC

Pyriproxifen (Πυριπροξифέν) 10% Υγρό γαλακτωματοποιίσιμο

Εγγυημένη σύνθεση: **Pyriproxifen** 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 88,3% β/β

A.A.Δ.A.: 14469/24.01.2014

Εντομοκτόνο-ρυθμιστής ανάπτυξης-μυμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά μέσω επαφής και κατάποσης στη μορφογένεση, αναπαραγωγή και εμβρυογένεση των εντόμων.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της άδειας:

Proplan - Plant Protection Company SL

C/Valle del Roncal 12

28232 Las Rozas, Madrid, Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

Θεσσα/νίκ: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία

Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453

Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας



01/A/2014-1

Μέλος του



Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και μέσα ατομικής προστασίας κατά την εφαρμογή σε αγρούς. Φοράτε γάντια και αδιαπέραστη ενδυμασία κατά την εφαρμογή σε θερμοκήπια.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Αποφύγετε ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθοστρώτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

Εσπεριδοειδή: **25** μέτρα, αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός, ή **15** μέτρα, αν χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός με μπεκ 50% μείωσης της διασποράς σταγονιδίων.

Μηλοειδή-Πυρηνόκαρπα: **15** μέτρα, αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός, ή **10** μέτρα, αν χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός με μπεκ 50% μείωσης της διασποράς σταγονιδίων.

Αμπέλι-Ελιές-Καλλιωπιστικά: **10** μέτρα, με συμβατικό εξοπλισμό.

Δεν απαιτείται αψέκαστη ζώνη προστασίας εφόσον χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός με μπεκ μείωσης της διασποράς του ψεκάστικού νέφους κατά 97% σε εσπεριδοειδή, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα και κατά 74% σε ελιά και αμπέλι.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 21 07793777

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500 κ.εκ.



ΣΥΛΛΟΓΗ:

Εντομοκτόνο-ρυθμιστής ανάπτυξης-μυμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά, μέσω επαφής και κατάποσης, στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους (ωό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο), παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους. Συγκεκριμένα έχει επίδραση: α) Στα ωά ηλικίας 1-3 ημερών, όπου η εκκόλαψη περιορίζεται ή επιβραδύνεται και παρατηρούνται μετεμβρυσικές αλλοαγές. β) Αναστέλλει τη μεταμόρφωση των προνυμφών. γ) Προκαλεί παρεμπόδιση της έκδυσης των νυμφών και της εμφάνισης των ακμαίων, και δ) Έχει στερωτικές ιδιότητες στα θηλυκά, με αποτέλεσμα μειωμένη ωοτοκία και ελάττωση της βιωσιμότητας των ωών. Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος στα έντομο-στόχους εμφανίζεται πιο αργά και σταδιακά, συγκρινόμενη με αυτήν των εντομοκτόνων που δρουν στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Είναι ιδιαίτερα δραστικό σε κοκκοειδή και αλευρώδεις, όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Η μετακίνηση της δραστικής ουσίας γιγρίπροξifen στα φυτά είναι διεπασματική.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις (3) φορές.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού)-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ-ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ: Κοκκοειδή, Κόκκινη ψώρα, Αρπιδιωτός, Λεκάριο, Κηροπλάστης, Μυτιλομόρφη ψώρα, Παρλιτάτρια και άλλα είδη. Δόση: **50-75 κ.εκ.** Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ:** Δόση: **37,5-50 κ.εκ.** Κοκκοειδή, Ψώρα του Σαν Ζοζέ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων. Βαμβάκδα. Ψεκασμός στο στάδιο γονιμοποιημένων θηλυκών. **ΚΕΡΑΣΙΑ-ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ:** Δόση: **37,5-50 κ.εκ.** Κοκκοειδή, Ψώρα του Σαν Ζοζέ. Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. Βαμβάκδα. Ψεκασμός στο στάδιο γονιμοποιημένων θηλυκών. **ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ:** Κοκκοειδή, Ψώρα του Σαν Ζοζέ. Δόση: **37,5-50 κ.εκ.** Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές. **ΕΛΙΑ:** Κοκκοειδή. Δόση: **25-30 κ.εκ.** Ψεκασμός πριν την άνθηση με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς. **ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο & Οινοποιήσιμο):** Κοκκοειδή, Ψευδόκοκκοι, Pulvinaria vitis και άλλα είδη. Δόση: **50-75 κ.εκ.** Ψεκασμός πριν την άνθηση με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς. **ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (θερμοκηπίου):** Αλευρώδεις. Δόση: **50-75 κ.εκ.** (μέγιστη δόση **95 κ.εκ./στρ.**). Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (ετήσια & πολυετή/ξυλώδη - θερμοκηπίου & υπαίθρου):** Δόση: **50-75 κ.εκ.** Αλευρώδεις. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. Κοκκοειδή. Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):

Πορτοκαλιά-Λεμονιά-Μανταρινιά (200), Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά-Κερασιά-Βερυκοκιά-Μηλιά-Αχλαδιά (80-100), Ελιά (70-125), Τομάτα-Μελιτζάνα (50-150), Αμπέλι-Καλλωπιστικά (50-100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:

Πορτοκαλιά-Λεμονιά-Μανταρινιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά (1), Κερασιά-Βερυκοκιά-Μηλιά-Αχλαδιά-Ελιά-Αμπέλι (1, πριν την άνθηση), Τομάτα-Μελιτζάνα (2 / 10 ημέρες), Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (2 / 10 ημέρες), Καλλωπιστικά υπαίθρου (1).

Παρατηρήσεις:

- 1) Σε περίπτωση ψηθίων πληθυσμών ακμαίων αλευρώδων, να χρησιμοποιείται κατάλληλο ακμαιοκτόνο, ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός και κατόπιν να εφαρμόζεται το **Zulu® 10EC**.
- 2) Στα Πυρηνόκαρπα, για την καταπολέμηση της Ψώρας του Σαν Ζοζέ, στην προανθηκή εφαρμογή, ο συνδυασμός του με θερμινό πολτό (paraffin oil EC) αυξάνει την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.
- 3) Σε κάθε περίπτωση, να εφαρμόζεται η συνιστώμενη συγκέντρωση, δηλαδή η δόση σε κ.εκ./100 λίτρα νερό.
- 4) Στην Τομάτα και Μελιτζάνα, η συνιστώμενη δόση ανά 100 λίτρα νερό να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Πορτοκαλιά-Λεμονιά-Μανταρινιά: **30 ημέρες.**

Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά: **21 ημέρες.**

Τομάτα-Μελιτζάνα (θερμοκηπίου): **3 ημέρες.**

Μηλιά-Αχλαδιά-Κερασιά-Βερυκοκιά-Ελιά-Αμπέλι: **Δεν ορίζεται** (Εφαρμογή πριν την άνθηση).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μπορεί να συνδυασθεί με λάδια στις προανθητικές εφαρμογές.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.