

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και αμέσως μετά τη χρήση. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυνθείτε επιμελώς με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση κατάποσης: Αν καταποθεί, κάνετε πλύση στομάχου. Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210-7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα.

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ: Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρους. Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Αν ρυπανθούν τα νερά της άρδευσης να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μέσα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορριπτανικό.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκευόμενο στην αρχική του συσκευασία, σε κανονικές θερμοκρασίες σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, μακριά από απ' ευθείας έκθεση στο φως, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται tripλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Στο επάνω μέρος του δοχείου



Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ZYGOMA 50 SC

Ζιζανιοκτόνο

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Flumeturon (φλουομετουρόν) 50%

Εγγυημένη Σύνθεση: flumeturon: 50% B/O

Βοηθητικές ουσίες: 56,17% B/B

ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΟ - ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7644/22-8-2006

Κάτοχος της Έγκρισης:

Nufarm Espana S.A.
C/Balmes 200, 1o 4º Barcelona,
08006, Spain

Υπεύθυνος Επικοινωνίας - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:

Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Γούναρη 40 & Μεσογείων 467
153 43, Αγ. Παρασκευή
Τηλ: 210 6990 932, Fax: 210 6990 862
e-mail: info@gr.nufarm.com

Διανομέας:



ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ. Γληνού 32, Βούλαρη, Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ: 2310 311377, Fax: 2310 334378
e-mail: ypsilon-agro@ypsilon-agro.com | www.ypsilon-agro.com

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.)	Όγκο ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.	ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος
Βαμβάκι	Καταπολέμηση ετήσιων, πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων	250-500	30-60	Αμέσως μετά την σπορά.	1
		200	30-60	Μεταφύτευτικά όταν το βαμβάκι έχει ύψος 10-15 εκ. με κατευθυνόμενο ψεκασμό στην βάση των βαμβακοφύτων.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφριά εδάφη.
- Σε 7-10 μέρες από την εφαρμογή του να ακολουθεί βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρ.

ΕΤΗΣΙΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Μουχρίτσα (*Echinochloa spp.*), Σετάριες (*Setaria spp.*), Ήρες (*Lolium spp.*).

Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:

Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*), Βλήτο (*Amaranthus spp.*), Χαμομήλι (*Chamomilla recutita*), Λουβουδιές (*Chenopodium spp.*), Μεγαλόκαρπη κολληταίδα (*Galium aparine*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*), Λάπαθο (*Rumex spp.*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Πολυκόμυτι (*Polygonum aviculare*).

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*), Αγριοβίσκος (*Hibiscus trionum*), Μολόχα (*Malva spp.*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*).

Τελευταία Επέμβαση Πριν τη Συγκομιδή: Δεν εφαρμόζεται.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμπόδιζει τη φωτοσύνθεση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφος ψεκασμός αμέσως μετά τη σπορά ή μεταφύτευτικά κατευθυνόμενος ψεκασμός στη βάση των βαμβακοφύτων όταν έχουν ύψος 10-15 εκ. με 30-60 λίτρα ανά στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση, με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45psi) και με μικρό τύπου σκούπα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας του βαμβακιού, μη σπέρνετε και μη φτεύτετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του.

Εάν χρησιμοποιηθεί σε δόση μεγαλύτερη από 400 κ.εκ. ανά στρέμμα, τότε δεν πρέπει να φτεούνται μετά την συγκομιδή του βαμβακιού ευαίσθητες καλλιέργειες (σιτάρι, σόγια, ζαχαρότευτλα, λάχανα, κολοκυνθοειδή, αραχίδα, τομάτα, μελιτζάνα) παρά μόνο αφού περάσει 1 χρόνος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινούμε καλά το φάρμακο και διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι απόλυτα εκλεκτικό για το βαμβάκι και δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με θειοκαρβαμικά ζιζανιοκτόνα.