

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών-προσώπου.
- Σε περίπτωση ατυχήματος ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
- Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
- Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση κατάποσης, να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός, μόνο εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα.

Σε περίπτωση εισπνοής, να μεταφερθεί ο ασθενής στον καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει να γίνει τεχνητή αναπνοή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροϊκού οξέος.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.

Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά.

Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

ACARAMIK[®]
1,8 EC

Abamectin (Αμπαμεκτίν) Γαλακτωματοποιήσιμο Συμπύκνωμα (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Abamectin: 1,8% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 98,2% β/β.

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από αστία.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

N



Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 14236/22-04-2008



Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
ROTAM Agrochemical Europe Ltd., Ashdown House, 29 Gildredge Road,
Eastbourne, East Sussex, BN21 4RU, Ηνωμένο Βασίλειο

Διανομή: AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 1089, 57022 Σίνδος
Τηλ: 2310 796556, 2311 998600, Fax: 2310 796506, 2311998601, e-mail: info@agrology.eu

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Να μην συνδυάζεται με διαβρέκτες ή άλλα πρόσθετα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αχλαδιά: 14 ημέρες. Τομάτα υπαίθρου: 3 ημέρες. Τομάτα θερμοκηπίου: 7 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του, κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

Ημερ. Παρασκευής

Ημερ. Λήξης: Βλέπε συσκευασία

Αριθμ. Παρτίδας:

Περιεχόμενο: 1 ΛΙΤΡΟ

1006



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέτουμε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος και λαδιού (όπου συνιστάται), αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αχλαδιά: Ψύλλα: Με την εμφάνιση 8-12 προνυμφών ανά ετήσιο βλαστό μήκους 20 εκ. Δόση: 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού + 250 κ.εκ. παραφινικού λαδιού (θερινός πολτός).

Τομάτα (υπαίθρου): Τετράνυχος: Με την εμφάνιση 5-10 κινητών μορφών ανά φύλλο. Δόση: 60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Λιριόμυζα:** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δόση: 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Τομάτα (θερμοκηπίου): Τετράνυχος: Με την εμφάνιση 5-10 κινητών μορφών ανά φύλλο. Δόση: 60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Λιριόμυζα:** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δόση: 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Τριανταφυλλιά: Τετράνυχος: Με την εμφάνιση των ακάρεων. Δόση: 40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Ντάλια: Τετράνυχος: Με την εμφάνιση των ακάρεων. Δόση: 40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Λιριόμυζα:** Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δόση: 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Ζέρμπερες: Λιριόμυζα: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δόση: 75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Δύο (2) εφαρμογές για όλες τις καλλιέργειες.

Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: Επτά (7) ημέρες για όλες τις καλλιέργειες.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Αχλαδιά: 100-150. Τομάτα (υπαίθρου): 50-100. Τομάτα (θερμοκηπίου): 50-200. Τριανταφυλλιά, Ντάλια, Ζέρμπερες: 50-80.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Στην Αχλαδιά δεν πρέπει να εφαρμόζεται ο συνδυασμός ACARAMIK 1,8 EC + λάδι, 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου Captan.



AGROLOGY
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

www.agrology.eu

AGROLOGY
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ