



26,5cm

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης καταπολέμησης του αλευρώδη στην τομάτα και το αγγούρι θερμοκηπίου και υπαίθρου, γίνεται εφαρμογή όταν ο πληθυσμός του αλευρώδη είναι 3 περίπου ακμιά ανά δυο φύλλα και 10-20 προνύμφες 2ου και 3ου σταδίου ανά φύλλο ή μεγαλύτερος.

Στη συνέχεια (μετά πάροδο 1-2 ημερών) γίνεται η πρώτη εξαπόλυση του παρασίτου Encarsia formosa σε πληθυσμό 2-3 άτομα/ φυτό για καλλιέργεια θερμοκηπίου ή 2000-3000 άτομα /στρέμμα για καλλιέργεια υπαίθρου. Εφόσον τα αποτελέσματα της δράσης του παρασίτου δεν είναι ικανοποιητικά και ο αριθμός των ακμιών και προνυμφών του αλευρώδη είναι εκείνος που αναφέρθηκε πιο πάνω γίνεται δεύτερη εφαρμογή του σκευάσματος πριν από τη 2η και 3η εξαπόλυση του Encarsia formosa Διατηρείτε ένα διάστημα 15 ημερών μεταξύ των δυο ψεκασμών.

2. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:

Εσπεριδοειδή: 200-400 λίτρα. Ακρόδρυα: 100-150 λίτρα. Μηλοειδή: 150-250 λίτρα.

Πυρηνόκαρπα: 150-250 λίτρα. Αμπέλι: 50-150 λίτρα. Λαχανικά: 50-150 λίτρα.

3. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4 εφαρμογές.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα και ροτενόνη.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και πριν τη συγκομιδή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το μακριά από πρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης να χορηγηθεί γάλα και να προκληθεί εμετός. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, στην αρχική του παραβίαστη συσκευασία. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Ημερ. Παρασκευής:

Αριθμός Παρτίδας:

ACARIDOIL 13 SL

POTASSIUM FATTY ACIDS
(ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ) 13,04%

ΥΓΡΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ

Εγγυημένη σύνθεση: Άλατα καλίου λιπαρών οξέων 13,04% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 80% β/β

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση κυρίως του αλευρώδη
στα πλαίσια εφαρμογής προγράμματος ολοκληρωμένης
καταπολέμησης. Συνιστάται επίσης για ακάρεα, αφίδες,
θρίπες, και άλλα έντομα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 14026/26.1.04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 950 κ.εκ.

Παρασκευαστής και συσκευαστής:

ΒΙΟΡΥΑ Α.Ε.
ΧΗΜΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
28ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
190 14 ΑΦΙΔΝΑΙ,
ΤΗΛ.: +30 22950 - 45100



ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ -ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση κυρίως του αλευρώδη στα πλαίσια εφαρμογής προγράμματος ολοκληρωμένης καταπολέμησης σε συνδυασμό με το παράσιτο ENCARSIA FORMOSA, σε τομάτα και αγγούρι. Συνιστάται επίσης για αφίδες, θρίπες, ακάρεα, κοκκοειδή, βαμβάκδα, ψύλλα, βρωμούσες και τζιτζικακία σε όλες τις καλλιέργειες υπαίθρου: λαχανικά (φασόλια, μπιζέλια, κολοκυνθοειδή, λάχανα, κουνουπίδια, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα), μηλιά, αχλαδιά, εσπεριδοειδή, αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, αμπέλι, καλλωπιστικά φυτά και φυτά εσωτερικού χώρου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Πρέπει να γίνεται ψεκασμός πλήρους καλύψεως του φυλλώματος. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να είναι "σκληρό". Αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται βρόχινο ή απεσταγμένο νερό. Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή με δυνατό ήλιο ή μεγάλη υγρασία. Δεν πρέπει να ψεκάζονται φυτά που βρίσκονται σε κατάσταση stress. Δραδί' επαφής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο την απαιτούμενη δόση. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

ΔΟΣΗ: 1900 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Εφαρμόζεται στις παρακάτω καλλιέργειες για την καταπολέμηση εντόμων και ακάρεων με την εμφάνιση της προσβολής. Γίνεται επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων.

Εσπεριδοειδή (λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, γκρέιπ φρούτ): Αλευρώδης, αφίδες, κοκκοειδή, θρίπες και ακάρεα.

Ακρόδρυα (αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά): Αφίδες, θρίπες, κοκκοειδή και ακάρεα.

Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά): Αφίδες, κοκκοειδή, θρίπες, ψύλλα και ακάρεα.

Πυρηνόκαρπα (βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά): Αφίδες, θρίπες, κοκκοειδή, βαμβάκδα και ακάρεα.

Αμπέλι: θρίπες, κοκκοειδή, τζιτζικακία και ακάρεα.

Λαχανικά (τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα, φασόλια, μπιζέλια) κολοκυνθοειδή, λάχανα, κουνουπίδια: Αλευρώδης, αφίδες, βρωμούσες, θρίπες και ακάρεα.

Καλλωπιστικά, φυτά εσωτερικού χώρου: Αφίδες, θρίπες, κοκκοειδή και ακάρεα.