

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην προκληθεί εμετός. Συνιστάται πλύση στομάχου ή/και λήψη ενεργού άνθρακα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτία δεδομένων ασφαλείας.
**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ
Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός Παρτίδας:



Altis® 25 EW

tebuconazole (τεμπουκοναζόλ)
Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)

Εγγυημένη Σύνθεση:
tebuconazole 25 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 74.85 % β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Xn

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Ερεθίζει το δέρμα
- Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
- Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης

N

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60.178/ 26-3-2008

Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής σκευάσματος:

SIPCAM S.p.A, Ιταλία

Υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, Ήρας 3, 19400 Κορωπί,

Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139,

E-mail: info@sipcam.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 800 κ. εκ.



SIPCAM

ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστάμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.

ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο : 40-50 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. (Μέγιστη ποσότητα σκευάσματος: 100 κ.εκ./στρ.). Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από την πράσινη κορυφή μέχρι την πώση των πετάλων και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. Θεραπευτικές εφαρμογές μόνο κατόπιν σχετικής σύστασης από τα Κέντρα των γεωργικών προειδοποιήσεων. **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):** 100-200

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: α) Ωίδιο: 50 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. (Μέγιστη ποσότητα σκευάσματος: 100 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές από το στάδιο εμφάνισης του καρπιδίου και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. β) Μονιλία καρπών: 50-75 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. (Μέγιστη ποσότητα σκευάσματος: 150 κ.εκ./στρ.). Μία (1) εφαρμογή για προστασία των ώριμων καρπών πριν από τη συγκομιδή και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνον εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά τη συγκομιδή τους. **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):** 150-200.

ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο: 40 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. (Μέγιστη ποσότητα σκευάσματος: 40 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές από το στάδιο της καρπώδους μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής ανά 12-14 ημέρες. **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):** 80-100.

ΣΠΑΡΑΓΓΙ: Σκωρίαση: 100 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. (Μέγιστη ποσότητα σκευάσματος: 100 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ανά 14 ημέρες. **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):** 100.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκέυασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση του ALTIS 25EW μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μηλιά, Ροδάκινια, Νεκταρίνια, Αμπέλι: **2**, Σπαράγγι: **3**.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά: **35** ημέρες, Ροδάκινια – Νεκταρίνια: **7** ημέρες, Αμπέλι: **21** ημέρες, Σπαράγγι: **6** μήνες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Συνδυαστικότητα: ---