

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ. • Να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωτοφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. • Όταν το χρησιμοποιείτε φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα προστατευτικά γάντια. • Να διατηρείται μόνο στην αρχική του συσκευασία. • Πλύνετε τα χέρια τα ακόλουθα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. • Να μη χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μη προκληθεί έμετος. Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε το παθόντα στην καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα ρούχα στα οποία έπασε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικινδύνους απόβλητα.

Αποφύγετε την απελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες, δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι οиноποίησης 21 ημερες. Πατάτα 7 ημέρες.

Φυτοτοξικότητα: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και καλλιεργίες που συνιστάται και κάτω από τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συνδυαστικότητα: Στο αμπέλι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με λάδια, σκευάσματα dodine, ή αλκαλικά σκευάσματα όπως ο βορδιγάλειος πολτός.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίες (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκυκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, προστασρό, καλά αεριζόμενο και κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός Παρτίδας:




Azzuro[®] 50 SC

Fluazinam (φλουαζινάμ)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη Σύνθεση:
fluazinam 50 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 60,55 % β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Το Fluazinam παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**



Αρ. Εγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Αναπτ. & Τροφ.: 60.205/18.8.2008

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, Ήρας 3, 194 00 Κορωπί, Τηλ. 210 522 3834
Κάτοχος της έγκρισης, παρασκευαστής και υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: CHEMINOVA A/S, Δανία



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως

ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ: Τεφρά σήψη.

Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου στα στάδια: α) στην άνθιση β) πριν από το κλείσιμο της σταφυλής γ) στο γυάλισμα και δ) στην ωρίμανση. Όγκος ψεκαστικού υγρού **100 λίτρα/στρέμμα Δόση 100 – 150 κ.εκ.** σκευάσματος στα **100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.**

ΠΑΤΑΤΑ: Περονόσπορος.

Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15 – 20 εκατοστά. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης προσβολής να εφαρμόζεται η μεγάλη δόση με το μικρό μεσοδιάστημα. Όγκος ψεκαστικού υγρού **100 λίτρα/στρέμμα Δόση 30 – 40 κ.εκ.** σκευάσματος στα **100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.**

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Αμπέλι οινόποιηση 4, Πατάτα 6.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

• Η δόση είναι ανάλογη με την ένταση της προσβολής.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού.

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

- Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες
- Απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος με επινώτιο ψεκαστήρα διότι δεν είναι ασφαλής ακόμη και με τη χρήση πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας.
- Στο αμπέλι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με λάδια, σκευάσματα dodine ή αλκαλικά σκευάσματα όπως ο βορδιγάλειος πολτός.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.

- Μη μπαίνει σε έκταση που ψεκάστηκε με το προϊόν πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του.